

CATÁLOGO



Produção

SAÚDE E ALTA PERFORMANCE

ANESTÉSICO LOCAL

LIDO Farm



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Cloridrato de lidocaína _____ 2,0 g
Epinefrina _____ 2,0 mg
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

Disponível em

Frasco
contendo
50 mL

Frasco
contendo
20 mL



MODO DE USAR

Via subcutânea, epidural ou infiltrações.

POSOLOGIA

Bovinos e equinos adultos: de 5,0 mL a 10,0 mL.
Bezerros, potros, ovinos, caprinos e suínos:
de 2,5 mL a 5,0 mL.

ANTIEMPAZINAMENTO

PANZINOL



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Silicone (poli-dimetil-siloxana) _____ 1,5 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

Disponível em

Frasco
contendo
100 mL
(acompanha
seringa
dosadora)



MODO DE USAR

Via oral.

POSOLOGIA

Bovinos e equinos: 100 mL, puro ou diluído em
½ litro de água morna.
Ovinos: 30 mL a 45 mL, puro ou diluído em ¼ de litro
de água morna.

ANTI-INFLAMATÓRIOS/ANALGÉSICOS

BIODEX



FÓRMULA

Cada 1 mL contém:
Dexametasona (fosfato dissódico) _____ 5,0 mg*
Veículo q.s.p. _____ 1,0 mL
*Equivalente a 3,8 mg de dexametasona base.

Disponível em

Frasco
contendo
50 mL

Frasco
contendo
10 mL



MODO DE USAR

Via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos (adultos): de 2 mL a 5 mL.
Ovinos, caprinos e suínos: de 1 mL a 3 mL.

BIOFEN 10%



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Cetoprofeno _____ 10,0 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

Disponível em

Frasco
contendo
100 mL

Frasco
contendo
50 mL

Frasco
contendo
10 mL



MODO DE USAR

Via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA

Equinos: 1 mL de BIOFEN 10% para cada
45 kg de peso corporal, 1 vez ao dia, durante 3 a 5
dias consecutivos. Dose equivalente a 2,2 mg de
cetoprofeno por kg de peso corporal.
Bovinos, ovinos, caprinos e suínos: 1,5 mL para
cada 50 kg de peso corporal, 1 vez ao dia durante
3 a 5 dias consecutivos. Dose equivalente a 3 mg
de cetoprofeno por kg de peso corporal.

CLAUDISAL



FÓRMULA

Cada 10 mL contém:
Salicilato de sódio _____ 0,500 g
Metilmelubrina (dipirona) _____ 0,500 g
Riboflavina _____ 0,003 g
Veículo q.s.p. _____ 10,0 mL

Disponível em

Frasco
contendo
50 mL



MODO DE USAR

Via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos (adultos): 10 mL.
Potros e bezerros (até 1 ano): 5 mL.

FLUIDO BIOFARM



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Salicilato de metila _____ 5,0 g
Essência de terebentina _____ 10,0 g
Cânfora _____ 1,0 g
Mentol _____ 1,0 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

Disponível em

Frasco
spray
contendo
100 mL

Frasco
spray
contendo
200 mL



MODO DE USAR

Umedecer a região afetada com o FLUIDO BIOFARM,
em seguida, friccionar bem durante 2 a 4 minutos com
a palma das mãos, utilizando luvas.

Nova
embalagem

ANTIBIÓTICOS/ANTIMICROBIANOS

BIOMAST



FÓRMULA

Cada seringa com 10 mL contém:
Cefoperazone _____ 250,0 mg
Veículo q.s.p. _____ 10,0 mL

Disponível em

Balde com
60 seringas
contendo
10 mL
cada

Display com
24 seringas
contendo
10 mL
cada



MODO DE USAR E POSOLOGIA

Aplicação intramamária. Após esgotar o leite,
limpar o teto com água e sabão, secá-lo com um
papel toalha limpo. Injetar o conteúdo da seringa
e massagear suavemente. Em casos de maior
gravidade, podem ser necessárias aplicações
subsequentes, sempre com intervalos de 24 horas.

BIOMAST VS



FÓRMULA

Cada 10 g contém:
Penicilina G procaina _____ 100.000 UI
Sulfato de di-hidroestreptomicina _____ 0,1 g
Sulfato de neomicina _____ 0,735 g
Veículo q.s.p. _____ 10,0 g

Disponível em

Balde com
60 seringas
contendo
10 g
cada

Display com
24 seringas
contendo
10 g
cada



MODO DE USAR E POSOLOGIA

Na secagem dos animais, após a última ordenha,
aplicar 1 seringa por teto em dose única.

Legenda:



Suínos



Coelhos



Aves

LINHA TERAPÊUTICA

BIOMAST Selante



FÓRMULA

Cada seringa com 4 g contém:

Subnitrato de bismuto	2,6 g
Óxido de zinco	0,2 g
Veículo q.s.p.	4,0 g

Disponível em

Display com 25 seringas contendo 4 g cada



MODO DE USAR E POSOLOGIA

Antes da aplicação do produto, os tetos devem ser limpos, desinfetados e secos, com o objetivo de evitar contaminação. Após a última ordenha da lactação (início do período seco), aplicar suavemente todo o conteúdo (4 g). **NÃO MASSAGEAR.** O produto deve estar em temperatura entre 15°C e 30°C no momento da aplicação.

COLÍRIO BIOFARM



FÓRMULA

Cada 10 mL contém:

Sulfacetamida sódica	0,060 g
Ácido bórico	0,020 g
Clorobutanol (álcool triclorobutílico)	0,003 g
Cloridrato de nafazolina	0,010 g
Veículo q.s.p.	10,0 mL

Disponível em

Frasco conta-gotas contendo 20 mL



MODO DE USAR E POSOLOGIA

Instilar 3 gotas nos olhos afetados a cada 8 horas, durante 5 dias.

ESTREPTOMICINA BIOFARM



FÓRMULA

Cada frasco contém:

Estreptomicina (sulfato)	6,25 g*
Diluyente q.s.p.	20,0 mL

*Equivalente a 5,0 g de estreptomicina base.

Disponível em

Frasco contendo 6,25 g (acompanha ampola de diluyente com 20 mL)



MODO DE USAR

Via intramuscular.

POSOLOGIA

1 mL para cada 25 kg de peso corporal (10 mg/kg), em intervalos de 12 horas.

ENTERO-Bio



FÓRMULA

Cada envelope com 15 g contém:

Ftalilsulfatiazol	1,00 g
Sulfaguanidina	1,50 g
Sulfato de estreptomicina	0,45 g
Hidróxido de alumínio	0,80 g
Pectina	0,60 g
Caulim	3,50 g
Veículo q.s.p.	15,00 g

Disponível em

Display com 10 envelopes contendo 15 g cada



MODO DE USAR

Via oral, misturado à ração ou em líquidos.

POSOLOGIA

Bezerros e potros: 1 envelope a cada 12 horas, misturado à ração.

Leitões, cabritos e cordeiros: ½ envelope a cada 12 horas, misturado à ração.

Aves: 1 envelope em 10 litros de água. Renovar diariamente a água medicada.

Recém-nascidos devem receber a metade da dose acima recomendada. O tratamento deve ser mantido durante 2 dias após o desaparecimento dos sinais clínicos.

FLOXICLIN



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Enrofloxacino	10,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular. Havendo necessidade de aplicar doses superiores a 10 mL, dividir a dose em dois ou mais pontos de aplicação.

POSOLOGIA

Bovinos, ovinos e suínos: a dose recomendada é 2,5 mg de enrofloxacino por kg de peso, o que corresponde a 1 mL de FLOXICLIN para cada 40 kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 3 a 5 dias consecutivos.

Disponível em

Frasco contendo 500 mL

Frasco contendo 50 mL

Frasco contendo 10 mL



TETRAVET



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina (cloridrato)	20,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

Disponível em

Frasco contendo 100 mL

Frasco contendo 50 mL

Frasco contendo 20 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular profunda.

POSOLOGIA

Dose única. 1 mL para cada 10 kg de peso corporal (20 mg de oxitetraciclina por kg de peso).



ANTIPARASITÁRIOS/ENDOPARASITICIDAS

BIOZEN



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Albendazol	10,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Via oral.

POSOLOGIA

Bovinos: utilizar 5 mL para cada 100 kg de peso corporal (combate de nematódeos gastrointestinais, pulmonares e cestódeos). Utilizar 7,5 mL para cada 100 kg de peso corporal (combate de ostertagia tipo II, infecções maciças de nematódeos gastrointestinais, pulmonares e cestódeos).

Ovinos e caprinos: 1 mL para cada 20 kg de peso corporal. Em animais infectados por fasciola hepática utilizar 1 mL para cada 10 kg de peso corporal.

Disponível em

Galão contendo 5 L

Frasco contendo 1 L

Frasco contendo 250 mL



RICOFarm 10



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Sulfóxido de albendazol	10,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

Disponível em

Frasco contendo 500 mL

Frasco contendo 250 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea.

POSOLOGIA

Nematódeos, cestódeos e trematódeos: dose de 1 mL para 40 kg de peso corporal.

Cisticercose: dose de 1 mL para 40 kg de peso corporal e repetir a aplicação aos 30, 60 e 90 dias após a primeira dose.

Ostertagia tipo II: dose de 1,5 mL para cada 40 kg de peso corporal.

Fasciola hepática: dose de 2 mL para cada 40 kg de peso corporal. Doses superiores a 10 mL devem ser subdivididas e aplicadas em locais diferentes.



EQUITRAT GOLD

FÓRMULA

Cada 100 g contêm:
Ivermectina _____ 1,87 g
Veículo q.s.p. _____ 100,00 g

MODO DE USAR

Via oral.

POSOLOGIA

A dose recomendada é de 1,07 g para cada 100 kg de peso ou 200 µg de ivermectina por kg de peso corporal.



Disponível em

Seringa dosadora contendo 6,42 g

EQUITRAT

FÓRMULA

Cada 100 g contêm:
Mebendazol _____ 20,0 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 g

POSOLOGIA

Peso do animal	Quantidade do produto
0 - 50 kg	2,5 g
50 - 100 kg	5,0 g
100 - 200 kg	10,0 g
200 - 300 kg	15,0 g
300 - 400 kg	20,0 g
400 - 500 kg	25,0 g
500 - 600 kg	30,0 g

MODO DE USAR

Via oral.

Nos casos de *Anoplocephala spp.* deve-se administrar o dobro da dose descrita na tabela. Nos casos de *Dictyocaulus arnfieldi* administrar 20 mg/kg/dia durante 5 dias.

Disponível em

Seringa dosadora contendo 30 g



ZANTEC

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Closantel _____ 12,5 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea.

POSOLOGIA

Bovinos:

Endoparasitas: 1 mL para cada 35 kg de peso corporal.

Ectoparasitas: 1 mL para cada 25 kg de peso corporal.

Ovinos e caprinos:

Endoparasitas: 1 mL para cada 25 kg de peso corporal.

Ectoparasitas: 1,5 mL para cada 25 kg de peso corporal.

Disponível em

Frasco contendo 200 mL



ANTIPARASITÁRIOS/ENDECTOCIDAS

ABACTIN Pour On

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Abamectina _____ 0,5 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Pronto para uso. Deve ser utilizado sobre a pele do animal na linha dorsal (fio do lombo).

POSOLOGIA

1 mL para cada 10 kg de peso corporal.

Disponível em

Frasco aplicador graduado contendo 1L



BIOMECTINA

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Ivermectina _____ 1,0 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea.

POSOLOGIA

1 mL para cada 50 kg de peso.

Disponível em

Frasco contendo 1L

Frasco contendo 500 mL

Frasco contendo 200 mL

Frasco contendo 50 mL

Ampola contendo 1 mL



ANTIPARASITÁRIOS/ECTOPARASITICIDAS

BIOTOX

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Amitraz _____ 12,5 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Pulverização e banho de imersão.

POSOLOGIA

Bovinos: fazer a diluição de 40 mL de BIOTOX para 20 litros de água, aplicando por pulverização no sentido contrário aos pelos, no total de 5 litros por animal adulto.

Ovinos e caprinos: aplicar em banho de imersão na proporção de 4 litros de BIOTOX para cada 1.000 litros de água na carga e 4 litros de BIOTOX para cada 500 litros de água na recarga.

Suínos: fazer a diluição de 20 mL de BIOTOX para cada 5 litros de água, banhando uma vez e repetindo após 14 dias.

Disponível em

Frasco contendo 1L

Frasco contendo 250 mL

Frasco contendo 40 mL

Frasco contendo 20 mL



CARRAPATOX

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Cipermetrina _____ 10,0 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Pulverizações.

POSOLOGIA

Bovinos, equinos, ovinos e caprinos: para pulverização diluir 20 mL do produto em 20 litros de água. Em bovinos utilizar aproximadamente 5 litros por animal adulto.

Instalações: diluir 20 mL em 4 litros de água para 40/60 m²; 40 mL em 8 litros de água para 80/120 m²; 100 mL em 100 litros de água para 120/180 m². Fazer aplicações com intervalo de 20 dias.

Disponível em

Frasco contendo 1L

Frasco contendo 250 mL

Frasco contendo 100 mL

Frasco contendo 20 mL



Legenda: Suínos

Coelhos

Aves

LINHA TERAPÊUTICA

BIOZOL



FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:

DDVP	1,00 g
Cipermetrina	0,50 g
Triclorfon	2,00 g
Violeta genciana	0,15 g
Colofônia (BREU)	10,00 g
Alcatrão	1,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

MODO DE USAR

Uso tópico.

POSOLOGIA

Após a limpeza do ferimento, aplicar o produto diretamente sobre o local a ser tratado. Repetir a aplicação a cada 24 horas até o desaparecimento dos sintomas. Usar luvas para a aplicação do produto.

Disponível em

Frasco contendo 250 mL



CYPERBIO PLUS



FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:

Cipermetrina	15,0 g
Clorpirifós	25,0 g
Butóxido de piperonila	1,5 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

Disponível em

Frasco contendo 1L

Frasco contendo 250 mL

Frasco contendo 100 mL

Frasco contendo 25 mL

MODO DE USAR

Uso tópico por meio de pulverização ou banho de imersão.

POSOLOGIA

BOVINOS

Produto	Água
25 mL	20 L
100 mL	80 L
250 mL	200 L
500 mL	400 L
1 L	800 L

SUÍNOS

Produto	Água
25 mL	10 L
100 mL	40 L
250 mL	100 L
500 mL	200 L
1 L	400 L



AVIÁRIOS E INSTALAÇÕES RURAIS: diluir 1 litro do produto em 400 litros de água. Após a retirada das aves e da cama, fazer lavagem e desinfecção do galpão e em seguida realizar a pulverização com CYPERBIO PLUS em todo o local, utilizando bomba de alta pressão preferencialmente. Utilizar 100 litros do produto/120 m² de área. No caso de aviários, retornar as aves à granja após 48 horas.

CYPERBIO PLUS Pour On



FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:

Cipermetrina	6,0 g
Clorpirifós	7,0 g
Butóxido de piperonila	0,5 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Uso tópico na região dorsal.

POSOLOGIA

SUÍNOS

Peso do animal	Dose
50 kg	2,5 mL
100 kg	5 mL
150 kg	7,5 mL
200 kg	10 mL
250 kg	12,5 mL
300 kg	15 mL

BOVINOS

Peso do animal	Dose
100 kg	10 mL
200 kg	20 mL
300 kg	30 mL
400 kg	40 mL
500 kg	50 mL



Disponível em

Frasco contendo 1L

ANTIPROTOZOÁRIOS

BABECID Grande Porte



FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:

Diminazeno diacetato	7,0 g
Antipirina	37,5 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular profunda.

POSOLOGIA

Para babesiose

(piroplasmose): 3,5 mg/kg, ou seja, 1 mL para cada 20 kg de peso corporal, em dose única.

Para tripanossomíase:

7,0 mg/kg, ou seja, 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, em dose única.

Para papilomatose:

3,5 mg/kg, ou seja, 1 mL para cada 20 kg de peso corporal, a cada 15 dias, durante 4 a 8 semanas.

Disponível em

Frasco contendo 50 mL

Frasco contendo 30 mL

Frasco contendo 20 mL



ANTITÓXICOS

ANTITÓXICO BIOFARM



FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:

Acetil DL-metionina	5,00 g
Cloreto de colina	3,00 g
Cloridrato de tiamina (Vit. B1)	1,00 g
Riboflavina (Vit. B2)	0,02 g
Nicotinamida (Vit. B3)	3,00 g
Pantotenato de cálcio (Vit. B5)	0,30 g
Cloridrato de piridoxina (Vit. B6)	0,20 g
Glicose	20,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular ou endovenosa.

POSOLOGIA

Bovinos e eqüídeos (animais de grande porte): 20 mL a 100 mL/dia.

Bezerros, potros, ovinos, caprinos e suínos (animais de médio porte): 10 mL a 30 mL/dia.

Leitões (animais de pequeno porte): 2 mL a 10 mL/dia.

Disponível em

Frasco contendo 100 mL

Frasco contendo 50 mL

Frasco contendo 20 mL



ANTISSÉPTICOS SPRAYS

VETIOLATE



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
 Timorosal _____ 100,0 mg
 Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Produto pronto para uso, exclusivamente tópico.

POSOLOGIA

Após a limpeza do local, aplicar sobre a área afetada diariamente até a cicatrização da lesão.

Disponível em

Frasco spray contendo 30 mL



DIURÉTICOS

ZOOFORMIN



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
 Hexametilenotetramina _____ 20,0 g
 Glicose anidra _____ 25,0 g
 Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via intravenosa.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos: 50 mL a 100 mL.

Ovinos, caprinos e suínos: 10 mL a 30 mL.

Disponível em

Frasco contendo 100 mL

Frasco contendo 50 mL



DERMATOMICÓTICOS

DERMOTAN



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
 Iodo ressublimado _____ 4,5 g
 Glicerina _____ 55,0 mL
 Tanino _____ 1,0 g
 Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Uso tópico, pronto para uso. Após a limpeza do local infectado, aplicar DERMOTAN direcionando a válvula spray diretamente sobre o local a ser tratado. Repetir a aplicação duas vezes ao dia até obter o resultado esperado ou a critério do médico-veterinário.

Disponível em

Frasco spray contendo 100 mL



SARNIRAN



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
 Monossulfiran (monossulfureto de tetraetilurano) _____ 2,5 g
 Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Sarniran é uma solução de uso tópico pronta para uso. Para facilitar o contato com a pele dos animais, recomenda-se a limpeza prévia das regiões afetadas, com água e sabão, enxugando-as em seguida. A quantidade do produto a ser aplicada deve ser suficiente para cobrir o local afetado e arredores. Após a aplicação, utilizar uma escova macia, friccionando lentamente o local, com o objetivo de auxiliar no contato entre a solução e a pele do animal. Aplicar uma vez ao dia durante 3 dias consecutivos; caso necessário, repetir o tratamento a cada 7 dias por duas semanas ou a critério do médico-veterinário.

Disponível em

Frasco spray contendo 100 mL



ESTIMULANTES ORGÂNICOS

ÓLEO CANFORADO COMPOSTO



FÓRMULA

Cada 10 mL contém:
 Guaiacol _____ 0,25 g
 Eucalipto _____ 0,60 g
 Cânfora _____ 1,50 g
 Clorofila _____ 0,02 g
 Veículo q.s.p. _____ 10,0 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos: 10 mL a 20 mL.

Suínos, caprinos e ovinos: 5 mL a 10 mL.

Disponível em

Frasco contendo 20 mL

Frasco contendo 10 mL



CAFEÍNA 25%



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
 Cafeína anidra _____ 25,0 g
 Benzoato de sódio _____ 25,0 g
 Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA

Bovinos e equinos adultos: 1 a 2 ampolas diariamente.

Disponível em

Frasco contendo 10 mL



ADEFarm



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
 Vitamina A (1.000 UI/mg) _____ 20.000.000 UI
 Vitamina D3 (40.000 UI/mg) _____ 5.000.000 UI
 Vitamina E (1 UI/mg) _____ 6.000 UI
 Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular.

POSOLOGIA

Bezerros: 1 mL para cada 50 kg de peso, repetindo a cada 30 dias.

Vacas em gestação e/ou lactação: 5 mL a cada 60 dias.

Bovinos em engorda a pasto: 5 mL a cada 90 dias.

Bovinos em engorda confinados: 5 mL a cada 60 dias.

Leitões: 0,5 mL uma só vez.

Capadetes: 1 mL a cada 60 dias.

Porcas em gestação: 3 mL uma só vez.

Cachaços: 3 mL a cada 60 dias.

Ovinos e caprinos jovens: 0,5 mL uma só vez.

Ovinos e caprinos adultos: 2 mL a cada 60 dias.

Disponível em

Frasco contendo 250 mL

Frasco contendo 50 mL



ADEFarm Oral



FÓRMULA

Cada 20 mL contém:
 Vitamina A _____ 500.000 UI
 Vitamina D3 _____ 300.000 UI
 Vitamina E _____ 20 UI
 Veículo q.s.p. _____ 20,0 mL

MODO DE USAR

Via oral.

POSOLOGIA

Bovinos e equídeos: 20 mL a cada 15 dias.

Éguas e vacas prenhes: administrar 20 mL aos 30 e 60 dias antes do parto e 30 dias pós-parto.

Potros e bezerros: 20 mL no 2º, 4º, 6º e 8º mês de idade.

Ovinos, caprinos e suínos: 10 mL a cada 15 dias.

Aves adultas em crescimento: 40 mL diluído em 5 litros de água e administrado a 50 animais uma vez a cada 3 meses.

Codornas: 20 mL diluído em 5 litros de água e administrar a 50 animais a cada 3 meses.

Cochilos: 20 mL diluído em 5 litros de água e administrar a 10 animais.

Disponível em

Frasco contendo 100 mL (acompanha seringa dosadora)



Legenda:



LINHA SUPLEMENTOS

CALCIOFarm

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Gluconato de cálcio	17,0 g
Lactato de cálcio	4,0 g
Glicose anidra	5,0 g
Cloreto de magnésio	2,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Via intravenosa ou subcutânea.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos: 100 mL a 200 mL.
Suínos, ovinos e caprinos: 20 mL a 30 mL.
Leitões: 5 mL.

Disponível em



C-M-22

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Borogluconato de cálcio	22,40 g
Borogluconato de magnésio	6,75 g
Glicose	10,00 g
Cafeína	1,00 g
Cianocobalamina (Vit. B12)	1,00 mg
Veículo q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Via intravenosa lenta, via subcutânea ou intramuscular. Neste caso, a dose deverá ser fracionada em dois ou mais locais de aplicação.

POSOLOGIA

A posologia recomendada é de 50 mL para cada 100 kg de peso corporal.

Disponível em



GLICOSE 50%

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Glicose anidra	50,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Via intravenosa.

POSOLOGIA

Bovinos e equinos (adultos): 100 mL a 500 mL diariamente.
Bezerros, potros, ovinos, caprinos e suínos: 50 mL a 200 mL diariamente.

Disponível em



HEPAVET

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Vitamina B12	4.000,0 mcg
Citrato de ferro amoniacal	0,6 g
Extrato hepático q.s.p.	100,0 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos: 5 mL a 10 mL.
Bezerros e potros: 5 mL.
Suínos, caprinos e ovinos: 2 mL a 4 mL.

Disponível em



SOROFarm

FÓRMULA

Cada 500 mL contém:

Cloreto de cálcio	120,0 mg
Cloreto de colina	1.500,0 mg
Cloreto de magnésio	200,0 mg
Cloreto de potássio	200,0 mg
Cloreto de sódio	3.500,0 mg
Dextrose	50.000,0 mg
DL-metionina	3.000,0 mg
Nicotinamida	1.200,0 mg
Vitamina B1	20,0 mg
Vitamina B2	50,0 mg
Vitamina B6	20,0 mg
Veículo q.s.p.	500,0 mL

**Acompanha ampola de 4 mL, contendo 10 mg de Vitamina B12.

MODO DE USAR

Via intravenosa, subcutânea ou intraperitoneal.

POSOLOGIA

Via intravenosa:
Bovinos e equinos adultos: 1.000 mL a 2.000 mL.
Potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos (acima de 3 meses): 500 mL.
Potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos jovens (abaixo de 3 meses): 20 mL a 50 mL.
Via subcutânea ou intraperitoneal:
Bovinos adultos: 100 mL a 300 mL.
Bezerros: 20 mL a 100 mL.
Leitões: 5 mL a 20 mL.

Disponível em



ORGANOVIT

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Ácido oleico	375,0 mg
Cloreto de cobalto	13,0 mg
Cloreto de magnésio	210,0 mg
Cloreto de sódio	42,0 mg
Cloreto de zinco	10,0 mg
Cloridrato de L-arginina	200,0 mg
Cloridrato de L-histidina	210,0 mg
Cloridrato de L-lisina	1.000,0 mg
DL-metionina	210,0 mg
Glicina	420,0 mg
Hidróxido de alumínio	30,0 mg
Hipofosfito de cálcio	1.500,0 mg
Iodeto de potássio	15,0 mg

L-leucina _____ 210,0 mg
 L-triptofano _____ 50,0 mg
 L-valina _____ 200,0 mg
 Monoglutamato de sódio _____ 420,0 mg
 Sulfato de cobre _____ 2,0 mg
 Vitamina B12 (cianocobalamina) _____ 5.000,0 mcg
 Vitamina D _____ 2.000.000,0 UI
 Vitamina E (acetato) _____ 100,0 UI
 Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea.

POSOLOGIA

Bovinos adultos: 10 mL.
Bezerros, ovinos e caprinos: 5 mL.

Disponível em



ESTROGIN



FÓRMULA

Cada 5 mL contém:
Benzoato de estradiol _____ 0,005 g
Veículo q.s.p. _____ 5,0 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular profunda ou epidural.

POSOLOGIA

Éguas e vacas: administrar 5 mL por via intramuscular ou 3 mL por via epidural.

Porcas: administrar 2 mL por via intramuscular.

Ovelhas e cabras: administrar 1,5 mL por via intramuscular.

PRECAUÇÕES

ESTROGIN não deve ser utilizado em fêmeas em gestação por provocar aborto. Nas fêmeas em lactação, o uso do ESTROGIN em doses baixas (1/5 da dose habitual = 1 mL) provoca o aumento da produção de leite; e as doses altas, a diminuição da produção de leite.

Disponível em



MEGA-EQUI



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Undecilenato de boldenona _____ 5,0 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular profunda.

POSOLOGIA

Peso do animal	Dose
150 kg	0,75 mL a 3,30 mL
200 kg	1,00 mL a 4,40 mL
250 kg	1,25 mL a 5,50 mL
300 kg	1,50 mL a 6,60 mL
350 kg	1,75 mL a 7,70 mL
400 kg	2,00 mL a 8,80 mL
450 kg	2,25 mL a 9,90 mL
500 kg	2,50 mL a 11,00 mL

Disponível em



OCITOCINA BIOFARM



FÓRMULA

Cada 1 mL contém:
Ocitocina sintética _____ 10,0 UI
Veículo q.s.p. _____ 1,0 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea, intramuscular, intravenosa ou epidural.

POSOLOGIA

ESPÉCIE	VIAS DE ADMINISTRAÇÃO		
	Intravenosa	Subcutânea ou intramuscular	Epidural
Vacas e éguas	1,0 - 2,5 mL	2,0 - 5,0 mL	1,5 - 3,0 mL
Porcas até 200 kg	0,5 - 1,0 mL	1,0 - 2,0 mL	-
Porcas acima de 200 kg	1,0 - 2,0 mL	3,0 mL	-
Ovelhas e cabras	0,25 - 1,0 mL	0,3 - 1,5 mL	-

PRECAUÇÕES

Não utilizar em fêmeas gestantes até o momento do parto. Não aplicar o produto quando a cervix uterina ainda não tiver alcançado a dilatação necessária ou, no parto distóico, até o correto posicionamento do feto.

Disponível em



LUBRIFICANTE E HIGIENIZADOR OCULAR

ACQUA Limp



FÓRMULA

Cada 10 mL contém:
Álcool polivinílico _____ 1,400 g
Citrato de sódio _____ 0,400 g
Cloreto de sódio _____ 0,250 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Instilar sobre a superfície ocular de 1 a 2 gotas, 4 vezes ao dia ou a critério do médico-veterinário.

Disponível em



ZOOVIT B1 Forte



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Cloridrato de tiamina (Vit. B1) _____ 20,0 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA

Animais de grande porte:

10 mL a 20 mL, durante 3 a 5 dias.

Animais de médio porte:

5 mL a 10 mL, durante 3 a 5 dias.

As doses acima podem ser alteradas a critério do médico-veterinário.

Disponível em



VITAMINAS

ZOOVIT B12



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Cianocobalamina (Vit. B12) 200.000 mcg _____ 0,20 g
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos:

Adultos: 10 mL.

Jovens: 5 mL.

Suínos, caprinos e ovinos:

Adultos: 5 mL.

Jovens: 2 mL.

Disponível em



ZOOVIT C



FÓRMULA

Cada 10 mL contém:
Ácido ascórbico (Vit. C) _____ 2,0 g
Veículo q.s.p. _____ 10,0 mL

MODO DE USAR

Via intravenosa.

POSOLOGIA

Equinos e bovinos: 20 mL diariamente.

Suínos, caprinos e ovinos: 10 mL diariamente.

Disponível em



Legenda:



Suínos



Coelhos



Aves

LINHA SUPLEMENTOS

BIOHORSE-BL

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Biotina (mínimo)	66,670 mg
Cálcio (mínimo/máximo)	157,000/212,300 g
Cobalto (mínimo)	6,300 mg
Cobre (mínimo)	475,000 mg
Ferro (mínimo)	2.968,000 mg
Flúor (máximo)	990,000 mg
Fósforo (mínimo)	99,000 g
Iodo (mínimo)	6,300 mg
Lisina (mínimo)	20,000 g
Magnésio (mínimo)	11,100 g
Manganês (mínimo)	2.380,000 mg
Niacina (mínimo)	1.100,000 mg
Pantotenato de cálcio (mínimo)	465,600 mg
Selênio (mínimo)	4,500 mg
Vitamina A (mínimo)	375.000,000 UI
Vitamina B1 (mínimo)	275,800 mg
Vitamina B12 (mínimo)	1.000,000 mcg
Vitamina B2 (mínimo)	472,800 mg
Vitamina B6 (mínimo)	78,800 mg
Vitamina D3 (mínimo)	50.000,000 UI
Vitamina E (mínimo)	1.000,000 UI
Zinco (mínimo)	2.975,000 mg

MODO DE USAR

Via oral, misturado à ração total, ao sal mineral ou ao sal comum.

POSOLOGIA

Potros até um ano: adicionar 50 g (1/4 de medida) ao sal ou 50 g do produto para 1 kg a 3 kg de ração.

Animais acima de um ano, em treinamento e garanhões: adicionar 100 g (meia medida) ao sal ou 100 g do produto para 3,5 kg a 5,5 kg de ração.

Éguas em terço final de gestação ou em lactação: adicionar 150 g (3/4 de medida) ao sal ou 150 g do produto para 3,5 kg a 5,5 kg de ração. Fornecer o produto final da mistura (BIOHORSE-BL + ração) na quantidade de 1,0% a 1,5% do peso do animal ao dia.

Disponível em

Pacote contendo 1kg

Pacote contendo 10kg



BIOGROW

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mínimo/máximo)	93,740/101,000 g
Cloro (mínimo)	100,530 g
Cobalto (mínimo)	266,000 mg
Cobre (mínimo)	650,000 mg
Enxofre (mínimo)	10,500 g
Ferro (mínimo)	2.100,000 mg
Flúor (máximo)	5.272,150 mg
Fósforo (mínimo)	71,010 g
Iodo (mínimo)	450,000 mg
Lisina (mínimo)	6.220,000 mg
Manganês (mínimo)	1.379,500 mg
Niacina (mínimo)	167,000 mg
Pantotenato de cálcio (mínimo)	54,000 mg
Selênio (mínimo)	45,000 mg
Sódio (mínimo)	65,940 g
Zinco (mínimo)	4.375,000 mg
Vitamina A (mínimo)	1.000.000,000 UI
Vitamina B1 (mínimo)	20,000 mg
Vitamina B2 (mínimo)	30,000 mg
Vitamina B6 (mínimo)	30,000 mg
Vitamina D3 (mínimo)	25.000,000 UI
Vitamina E (mínimo)	1.100,000 UI
Bacillus cereus (mínimo)	3,500000x10 ¹¹ UFC
Enterococcus faecium (mínimo)	3,500000x10 ¹¹ UFC
Lactobacillus acidophilus (mínimo)	3,500000x10 ¹¹ UFC
Ruminobacter amylophilum (mínimo)	3,000000x10 ¹¹ UFC
Ruminobacter succinogenes (mínimo)	3,000000x10 ¹¹ UFC
Succinobacillus dextrinosolvens (mínimo)	4,400000x10 ¹¹ UFC

Disponível em

Balde contendo 20 kg

Balde contendo 10 kg

Pacote contendo 1kg



MODO DE USAR

Via oral, misturado à ração total ou ao sal mineralizado.

POSOLOGIA

Adicionar 2 kg do produto para cada tonelada de ração ou misturar de 500 g a 1,0 kg do produto em 25 kg de sal mineralizado.

BIOCLIN-SS

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Cobalto (mínimo)	1.276,800 mg
Ferro (mínimo)	98.369,600 mg
Cobre (mínimo)	33.150,000 mg
Enxofre (mínimo)	490,000 g

MODO DE USAR

Via oral, misturado ao sal mineral.

POSOLOGIA

Misturar 500 g de BIOCLIN-SS para cada 25 kg de sal mineral.

Disponível em

Pacote contendo 1kg

Pacote contendo 10kg



ADEFARM-B

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Vitamina A (mínimo)	15.000.000,000 UI
Vitamina D3 (mínimo)	2.200.000,000 UI
Vitamina E (mínimo)	15.000,000 UI
Vitamina H (mínimo)	90,000 mg

MODO DE USAR

Via oral, misturado à ração total ou ao sal mineralizado.

POSOLOGIA

Suínos e aves: misturar 0,5 kg em 1 tonelada de ração.

Bovinos de corte e leite, ovinos, caprinos e equinos: misturar 1 kg de ADEFARM-B em 25 kg de sal mineralizado pronto para uso ou em 1 tonelada de ração.

Disponível em

Pacote contendo 1kg

Pacote contendo 10kg



CREATINA



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:
Creatina (mínimo) _____ 703,440 g
Maltodextrina (mínimo) _____ 200,000 g

MODO DE USAR

Via oral, misturado à ração.

POSIOLOGIA

Equinos adultos:

Dosagem inicial: 120 g/dia (4 medidas) durante 14 dias.

Esta dosagem poderá ser dividida duas vezes ao dia.

Dosagem de manutenção: 40 g/dia (1 medida e 1/3).

Se o produto for suspenso por mais de 18 dias, deve-se reiniciar o tratamento.



Disponível em

Pote contendo 1kg

Pote contendo 500g

CONDROFarm



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Sulfato de condroitina (mínimo) _____ 190,000 g
Glucosamina (mínimo) _____ 356,700 g
DL-metionina (mínimo) _____ 7.000,000 mg
L-glutamina (mínimo) _____ 20.000,000 mg
L-lisina (mínimo) _____ 10.000,000 mg
Prolina (mínimo) _____ 8.000,000 mg
Manganês (mínimo) _____ 6.000,000 mg

MODO DE USAR

Via oral, adicionar à ração.

POSIOLOGIA

Dosagem inicial: administrar 2 vezes ao dia durante 25 dias.

Equídeos adultos: 10 g.

Ruminantes adultos: 5 g.

Potros, pôneis e ruminantes jovens: 3 g.

Pequenos ruminantes: 1 g.

Suínos: 3 g.

Leitões: 0,5 g.

Dosagem de manutenção: administrar as doses acima uma vez ao dia durante 50 dias.



Disponível em

Pote contendo 1kg

Pote contendo 500g

SUPLEMENTOS ORAIS EM PÓ

HIDRAFarm



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (mínimo) _____ 4.500,000 mg
Cálcio (máximo) _____ 5.300,000 mg
Cloro (mínimo) _____ 400,000 g
Magnésio (mínimo) _____ 10,000 g
Maltodextrina (mínimo) _____ 170,000 g
Sódio (mínimo) _____ 180,000 g
Potássio (mínimo) _____ 66,000 g

MODO DE USAR

Via oral.

POSIOLOGIA

Bovinos adultos: diluir 20,0 g em 3 litros de água potável e fornecer ao animal individualmente até completa recuperação.

Equinos, muare e asininos adultos: diluir 40,0 g em 4 litros de água potável e deixar o animal beber à vontade ou diluir 40,0 g em 80 mL de água e administrar com auxílio de uma seringa por via oral. Em caso de animais atletas, fornecer a mistura de 4 a 6 horas antes do exercício e repetir após o exercício.

Bezerros, equinos, muare e asininos jovens: diluir 5,0 g em 1 litro de água potável e deixar o animal beber à vontade ou diluir 5,0 g em 20 mL de água e administrar com auxílio de uma seringa por via oral. Fornecedor a mistura em períodos de calor intenso e estresse térmico.

Suínos e aves adultas: diluir 2,0 g por litro de água potável ou 4,0 g para cada kg de ração. Fornecedor a mistura aos animais até a completa recuperação ou enquanto durar o desconforto causado por estresse térmico.

Coelhos: diluir 5,0 g em 1 litro de água potável e fornecer ao animal até completa recuperação.

Aroma de leite

Lançamento

Disponível em

Display com 12 sachês contendo 10g cada



SUPLEMENTOS ORAIS LÍQUIDOS

CALCILAN



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Calciferol _____ 0,0025 g
Vitamina A _____ 1,0 g
Vitamina B12 _____ 20,0 mcg
Fosfato tricálcico _____ 3,0 g
Lactato de cálcio _____ 2,0 g
Sorbitol _____ 10,0 mL
Veículo q.s.p. _____ 100,0 mL

MODO DE USAR

Via oral, misturado à ração ou ao leite.

POSIOLOGIA

Bovinos, equinos e caprinos:

Até 2 meses: 2 colheres de sopa (30 mL).

Adultos: 3 colheres de sopa (45 mL).



Disponível em

Frasco dosador graduado contendo 1L

Frasco dosador graduado contendo 500 mL

CALCIOFarm Mix PRO



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mínimo/máximo)	34,000/36,500 g
Fósforo (mínimo)	26,600 g
Magnésio (mínimo)	11,413 g
Selênio (mínimo)	20,000 mg
Vitamina A (mínimo)	1.200.000,000 UI
Vitamina B12 (mínimo)	33.333,330 mcg
Vitamina D3 (mínimo)	75.000,000 UI
Vitamina E (mínimo)	20.000,000 UI
Zinco quelatado (mínimo)	3.333,330 mg

MODO DE USAR

Via oral.

POSOLOGIA

Equídeos e bovinos adultos: 50 mL a 100 mL, uma vez ao dia.

Potros, ovinos e caprinos: 50 mL, uma vez ao dia.

Suínos adultos: 40 mL, uma vez ao dia.

Leitões: 5 mL a 10 mL, uma vez ao dia.

Bubalinos adultos: 50 mL a 100 mL, uma vez ao dia.

Bubalinos jovens: 50 mL, uma vez ao dia.



Disponível em

Frasco dosador graduado contendo 1L

Frasco dosador graduado contendo 500 mL

O que já era bom agora é PRO

Sabor Morango

HEMOFarm PRO



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido fólico (mínimo)	5.000,000 mg
Ácido nicotínico (mínimo)	1.200,000 mg
Cobalto (mínimo)	100,000 mg
Cobre quelatado (mínimo)	500,000 mg
Ferro quelatado (mínimo)	4.500,000 mg
Glicose	200,000 g
Magnésio (mínimo)	1.000,000 mg
Pantotenato de cálcio (mínimo)	1.200,000 mg
Vitamina B1 (mínimo)	1.500,000 mg
Vitamina B12 (mínimo)	15.000,000 mcg
Vitamina B2 (mínimo)	1.500,000 mg
Vitamina B6 (mínimo)	1.200,000 mg
Vitamina K3 (mínimo)	250,000 mg
Zinco quelatado (mínimo)	5.000,000 mg

MODO DE USAR

Via oral.

POSOLOGIA

Equinos, muare, asininos e bovinos: 20 mL
Potros recém-nascidos (2°, 6° e 10° dia após o nascimento): 10 mL

Potros, pôneis e bezerros: 15 mL

Ovinos, caprinos e avestruzes: 10 mL

Cordeiros, cabritos e avestruzes filhotes: 1 mL

Suínos: 5 mL

Leitões: 1 mL

Aves, roedores e répteis: Diluir 20 gotas em 1 L de água ou 2 gotas em 100 mL de água.



Disponível em

Frasco dosador graduado contendo 1L

Frasco dosador graduado contendo 500 mL

O que já era bom agora é PRO

Sabor Morango

GLICOFarm Master PRO



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido aspártico (mínimo)	10,323 g
Ácido glutâmico (mínimo)	18,646 g
Alanina (mínimo)	16,138 g
Arginina (mínimo)	11,293 g
Betaina (mínimo)	10,000 g
Cisteína (mínimo)	720,000 mg
Colina (mínimo)	10,000 g
Creatina (mínimo)	10,000 g
DL-metionina (mínimo)	21,430 g
Fenilalanina (mínimo)	4.129,000 mg
Glicina (mínimo)	44,856 g
Glicose	150,000 g

MODO DE USAR

Via oral.

POSOLOGIA

Equinos, muare, asininos e bovinos: 25 mL duas vezes ao dia.

Potros de sobreano e bovinos jovens: 15 mL duas vezes ao dia.

Potros e pôneis: 10 mL duas vezes ao dia.

Bubalinos adultos: 25 mL duas vezes ao dia.

Hidroxiprolina (mínimo)	14,706 g
Histidina (mínimo)	2.149,000 mg
Isoleucina (mínimo)	2.696,000 mg
L-carnitina (mínimo)	20,000 g
L-lisina (mínimo)	44,280 g
Leucina (mínimo)	6.278,000 mg
Magnésio (mínimo)	1.895,000 mg
Metionina (mínimo)	2.662,000 mg
Prolina (mínimo)	24,566 g
Serina (mínimo)	3.055,000 mg
Tirosina (mínimo)	2.317,000 mg
Treonina (mínimo)	1.790,000 mg
Triptofano (mínimo)	520,000 mg
Valina (mínimo)	4.656,000 mg

Bubalinos jovens: 15 mL duas vezes ao dia.

Ovinos, caprinos e avestruzes adultos: 10 mL duas vezes ao dia.

Cordeiros, cabritos e avestruzes filhotes: 2 mL duas vezes ao dia.

Suínos adultos: 5 mL duas vezes ao dia.

Leitões: 1 mL duas vezes ao dia.



Disponível em

Galão contendo 5L

Frasco dosador graduado contendo 1L

Frasco dosador graduado contendo 500 mL

O que já era bom agora é PRO

Sabor Morango

Legenda:



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos

LINHA SUPLEMENTOS

REVIGOREIDE BOOSTER



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:
 Cálcio (máximo/mínimo) 7.500,000 mg / 6.875,000 mg
 Cloro (mínimo) 290,000 g
 Frutooligosacarídeos (mínimo) 900,000 mg
 Glicina (mínimo) 3.738,000 mg
 Magnésio (mínimo) 11.875,000 mg
 Potássio (mínimo) 65,000 g
 Sódio (mínimo) 145,000 g
 Sacarina (mínimo) 1.125,000 mg
 Maltodextrina (mínimo) 3.525,000 mg
 Glutamina (mínimo) 2.500,000 mg

MODO DE USAR

Administrar por via oral.

POSOLOGIA

Equinos, muares e asininos: administrar 4 g de REVIGOREIDE BOOSTER para cada 100 kg de peso corporal diretamente na boca do animal. Fornecer o produto de 4 a 6 horas antes do exercício físico e do transporte e/ou após. Deixar água à disposição do animal durante e após a utilização do produto.



Disponível em

Cartucho
com
1 seringa
dosadora
contendo
40 g

Aroma
Maçã-
Verde

Lançamento

REVIGOREIDE M.O.



FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:
 Ácido aspártico (mínimo) 6.000,000 mg
 Ácido fólico (mínimo) 250,000 mg
 Ácido glutâmico (mínimo) 8.000,000 mg
 Biotina (mínimo) 60,000 mg
 Cálcio (mínimo/máximo) 40,000 g/48,000 g
 Cistina (mínimo) 825,000 mg
 Cobalto (mínimo) 160,000 mg
 Cobre quelatado (mínimo) 9,500 mg
 Colina (mínimo) 25,100 g
 Creatina (mínimo) 56,500 g
 Cromo (mínimo) 5,000 mg
 DL-carnitina (mínimo) 15,500 g
 DL-metionina (mínimo) 30,000 g
 Enxofre (mínimo) 500,000 mg
 Fenilalanina (mínimo) 2.600,000 mg
 Ferro quelatado (mínimo) 4.000,000 mg
 Flúor (máximo) 240,000 mg
 Fósforo (mínimo) 27,000 g
 Glicina (mínimo) 21,000 g
 Histidina (mínimo) 1.000,000 mg
 Inositol (mínimo) 100,000 mg
 Iodo (mínimo) 150,000 mg
 Isoleucina (mínimo) 2.500,000 mg
 L-alanina (mínimo) 16,000 g
 L-arginina (mínimo) 9.000,000 mg
 L-glutamina (mínimo) 84,000 g
 L-leucina (mínimo) 4.000,000 mg
 L-lisina (mínimo) 31,250 g
 L-treonina (mínimo) 24,000 g
 L-triptofano (mínimo) 6.700,000 mg
 L-valina (mínimo) 2.600,000 mg
 Magnésio (mínimo) 900,000 mg

Maltodextrina (mínimo) 30,000 g
 Manganês (mínimo) 125,000 mg
 Pantotenato de cálcio (mínimo) 3.100,000 mg
 Potássio (mínimo) 24,000 g
 Prolina (mínimo) 32,500 g
 Selênio (mínimo) 6,250 mg
 Serina (mínimo) 2.500,000 mg
 Taurina (mínimo) 17,750 g
 Tirosina (mínimo) 1.800,000 mg
 Vitamina A (mínimo) 375.000,000 UI
 Vitamina B1 (mínimo) 780,000 mg
 Vitamina B2 (mínimo) 315,000 mg
 Vitamina B3 (mínimo) 1.100,000 mg
 Vitamina B6 (mínimo) 2.100,000 mg
 Vitamina B12 (mínimo) 14.000,000 mcg
 Vitamina C (mínimo) 37,500 g
 Vitamina D3 (mínimo) 260.000,000 UI
 Vitamina E (mínimo) 8.000,000 UI
 Vitamina K3 (mínimo) 50,000 mg
 Zinco (mínimo) 2.200,000 mg



Disponível em

Cartucho
com
2 seringas
dosadoras
contendo
40 g
cada

Display com
12 seringas
contendo
80 g
cada

Aroma
Maçã-
Verde

Lançamento
(80 g)

MODO DE USAR

Administrar por via oral.

POSOLOGIA

Equinos adultos: Uma seringa de 80 g ou duas seringas de 40 g a cada 15 dias.

Potros: Meia seringa de 80 g ou uma seringa de 40 g a cada 15 dias.



Legenda:



Suínos



Coelhos



Aves

LINHA SUPLEMENTOS

FLORAFarm Bovinos

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Betaglucanos (mínimo)	12,270 g
Biotina (mínimo)	60,000 mg
Cobalto (mínimo)	440,000 mg
Cobre (mínimo)	6.712,000 mg
Iodo (mínimo)	709,000 mg
Mananoligossacarídeo (mínimo)	6.644,000 mg
Manganês (mínimo)	15,440 g
Niacina (mínimo)	6.000,000 mg
Selênio (mínimo)	180,000 mg
Zinco (mínimo)	32,000 g
<i>Bacillus cereus</i> (mínimo)	8,75x10 ⁸ UFC/g
<i>Bacillus subtilis</i> (mínimo)	3,25x10 ⁷ UFC/g

MODO DE USAR

Uso oral. Pasta pronta para uso.

POSOLOGIA

Bezerros: 4 g ao nascimento e 2 g de 7 em 7 dias até o desmame.

Animais desmamados, adultos e/ou em situações adversas: 4 g/animal/dia.

Exposições, provas de ganho de peso e torneios leiteiros: 8 g/animal/dia para iniciar a preparação até 34 g no dia do evento.

<i>Bifidobacterium bifidum</i> (mínimo)	3,50x10 ⁷ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i> (mínimo)	1,40x10 ⁸ UFC/g
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (mínimo)	1,40x10 ⁸ UFC/g
<i>Lactobacillus casei</i> (mínimo)	3,75x10 ⁷ UFC/g
<i>Lactobacillus lactis</i> (mínimo)	4,00x10 ⁷ UFC/g
<i>Ruminobacter amylophilum</i> (mínimo)	7,50x10 ⁸ UFC/g
<i>Ruminobacter succinogenes</i> (mínimo)	8,75x10 ⁸ UFC/g
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (mínimo)	2,00x10 ⁷ UFC/g
<i>Succinivibrio dextrinosolvens</i> (mínimo)	1,10x10 ⁷ UFC/g
Vitamina A (mínimo)	77.000,000 UI
Vitamina B12 (mínimo)	200,000 mcg
Vitamina D (mínimo)	9.625,000 UI
Vitamina E (mínimo)	350,000 UI

Disponível em

Seringa dosadora contendo 34 g

Lançamento



FLORAFarm Equi

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Betaglucana (mínimo)	19,360 g
Biotina (mínimo)	80,000 mg
Cobalto (mínimo)	36,000 mg
Cobre (mínimo)	845,000 mg
Extrato etéreo (mínimo)	57,000 mg
Ferro (mínimo)	993,000 mg
Fibra bruta (mínimo)	851,000 mg
Iodo (mínimo)	30,820 mg
Triptofano (mínimo)	1.803,000 mg
Magnésio (mínimo)	6.000,000 mg
Mananoligossacarídeo (mínimo)	11,750 g
Manganês (mínimo)	2.200,000 mg
Matéria mineral (mínimo)	2.835,000 mg
Niacina (mínimo)	8.259,000 mg
Nucleotídeos (mínimo)	1.616,000 mg
Proteína bruta (mínimo)	28,380 g

MODO DE USAR

Uso oral. Pasta pronta para uso.

POSOLOGIA

Potros: 2 g ao dia ao nascimento durante 7 dias.

Animais adultos: 4 g por animal por dia.

Selênio (mínimo)	40,500 mg
Zinco (mínimo)	3.803,000 mg
<i>Bacillus subtilis</i> (mínimo)	1,04x10 ⁸ UFC/g
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (mínimo)	1,12x10 ⁸ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i> (mínimo)	1,68x10 ⁸ UFC/g
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (mínimo)	1,68x10 ⁸ UFC/g
<i>Lactobacillus casei</i> (mínimo)	1,20x10 ⁸ UFC/g
<i>Lactobacillus lactis</i> (mínimo)	1,28x10 ⁸ UFC/g
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (mínimo)	1,00x10 ⁸ UFC/g
Vitamina A (mínimo)	179.300,000 UI
Vitamina B12 (mínimo)	30,000 mcg
Vitamina C (mínimo)	2.800,000 mg
Vitamina D (mínimo)	22.413,000 UI
Vitamina E (mínimo)	815,000 UI

Disponível em

Seringa dosadora contendo 34 g

Sabor Maçã-Verde

Lançamento



FLORAFarm Ovinos e Caprinos

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Betaglucanos (mínimo)	12,270 g
Biotina (mínimo)	30,000 mg
Cobalto (mínimo)	438,000 mg
Iodo (mínimo)	701,000 mg
Mananoligossacarídeo (mínimo)	6.644,000 mg
Manganês (mínimo)	2.002,000 mg
Niacina (mínimo)	3.005,000 mg
Selênio (mínimo)	175,500 mg
Zinco (mínimo)	7.750,000 mg
<i>Bacillus cereus</i> (mínimo)	8,75x10 ⁸ UFC/g
<i>Bacillus subtilis</i> (mínimo)	3,25x10 ⁷ UFC/g

MODO DE USAR

Uso oral. Pasta pronta para uso.

POSOLOGIA

Animais recém-nascidos: 4 g ao nascimento e 2 g de 7 em 7 dias até o desmame.

Animais desmamados, adultos e/ou em situações adversas: 4 g/animal/dia.

Exposições, provas de ganho de peso e torneios leiteiros: 6 g/animal/dia para iniciar a preparação até 16 g no dia do evento.

<i>Bifidobacterium bifidum</i> (mínimo)	3,50x10 ⁷ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i> (mínimo)	1,40x10 ⁸ UFC/g
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (mínimo)	1,40x10 ⁸ UFC/g
<i>Lactobacillus casei</i> (mínimo)	3,75x10 ⁷ UFC/g
<i>Lactobacillus lactis</i> (mínimo)	4,00x10 ⁷ UFC/g
<i>Ruminobacter amylophilum</i> (mínimo)	7,50x10 ⁸ UFC/g
<i>Ruminobacter succinogenes</i> (mínimo)	8,75x10 ⁸ UFC/g
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (mínimo)	2,00x10 ⁷ UFC/g
<i>Succinivibrio dextrinosolvens</i> (mínimo)	1,10x10 ⁷ UFC/g
Vitamina A (mínimo)	220.000,000 UI
Vitamina B12 (mínimo)	180,000 mcg
Vitamina D (mínimo)	27.500,000 UI
Vitamina E (mínimo)	1.000,000 UI

Disponível em

Seringa dosadora contendo 34 g

Lançamento



Legenda:



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos

LINHA SUPLEMENTOS



www.biofarm.com.br

(16) 3209-3500 |   

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710, CEP 14876-150
Jaboticabal/SP, Brasil