# BIOMAST

## **PREVENÇÃO DE MASTITES**

### **USO VETERINÁRIO** Suspensão Intramamária





#### **FÓRMULA**

Cada 10 g contém:

Penicilina G procaína	100.000 UI
Sulfato de di-hidroestreptomicina	0,1 g
Sulfato de neomicina	0,735 g
Veículo q.s.p.	10,0 g

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA: BOVINOS E CAPRINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "30" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - PRODUTO NÃO INDICADO PARA FÊMEAS EM LACTAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA
PODE CAUSAR A PRESENCA DE RESÍDUOS ACIMADOS LIMITES APROVADOS. TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

#### INDICACÕES

Tratamento e prevenção das mastites durante o período de secagem (vaca seca). BIOMAST VS foi especialmente desenvolvido para tratar e prevenir as mastites fora do período de lactação, com ação prolongada, estendendo-se por 5 semanas. Atua sobre os agentes causadores das mastites em bovinos e caprinos, como: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli, Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Corynebacterium spp., Micrococcus spp. e Pseudomonas

#### MODO DE USAR E POSOLOGIA

Após a última ordenha, proceder a higienização do úbere, desinfetando os tetos. Retire a tampa da seringa dosadora e aplique todo o conteúdo da seringa (10 g) de BIOMAST VS no canal do teto. Após a aplicação, massagear o úbere suavemente de baixo para cima facilitando a dispersão e penetração da suspensão nos quartos do úbere.



#### CONTRAINDICAÇÕES

BIOMAST VS não deve ser utilizado em vacas ou cabras durante o período de lactação. Não ordenhar as vacas e cabras após aplicação. Utilizar em vacas e cabras no mínimo 45 dias antes do parto. Não utilizar em animais com hipersensibilidade conhecida à penicilina e aminoglicosídeos.

#### PERÍODO DE CARÊNCIA

O leite dos animais tratados deverá ser descartado até 96 horas após o parto. O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 30 dias após a última aplicação.

#### **APRESENTAÇÃO**

Seringa contendo 10 g.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

> Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 1.582/55 em 11/04/1955.

#### Responsável técnico:

Dr. Naur Bellusci Filho CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

#### Proprietário e Fabricante: BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150 Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500 CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113







Bula BIOMAST VS 10 g

mm

00

28,

BIO 020228


Data: 06/12/2022

Programa: Corel/Photoshop



Papel OffSet 56g - Branco


68 mm x 128 mm





2 dobras

Horizontais



Sem

Dobra