

CYPERBIO PLUS

Pulverização e Banho

USO VETERINÁRIO
Pulverização e Banho

**ECTOPARASITICIDA:
CARRAPATICIDA,
MOSQUICIDA E BERNICIDA**

FÓRMULA
Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	15,0 g
Clorpirifós	25,0 g
Butóxido de piperonila	1,5 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

INDICAÇÕES
CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho é indicado no controle dos seguintes ectoparasitas:
Bovinos: Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Amblyomma cajennense* e *Anocentor nitens*. **Bernes:** larvas de *Dermatobia hominis*. **Moscas:** *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Dermatobia hominis*, *Musca autumnalis*, *Musca spp.*, *Tabanus spp.* e *Haematobia irritans* (Mosca dos chifres). **Piolhos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* e *Damalinia bovis*. **Sarnas:** *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Psoroptes natalensis* e *Chorioptes bovis*. **Suinos:** **Bernes:** larvas de *Dermatobia hominis*. **Moscas:** *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Musca spp.*, *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis* e *Musca autumnalis*. **Sarna:** *Sarcoptes scabiei* var. *suis*. **Aviários e instalações rurais:** indicado no controle de parasitas como *Alphitobius diaperinus* (besouro cascudinho adulto) e piolhos dos gêneros *Columbicola spp.*, *Cuclotogaster spp.*, *Goniocotes spp.*, *Goniodes spp.*, *Holomenopon spp.*, *Lipeurus spp.*, *Menacanthus spp.* e *Menopon spp.* - adultos.

MODO DE USAR E POSOLOGIA
CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho é um produto de uso tópico, que pode ser utilizado por meio de pulverização ou banho de imersão.

BOVINOS:
Pulverização: diluir o produto em água limpa obedecendo as seguintes dosagens:

Pulverização em bovinos	
Produto	Água
25 mL	20 litros
100 mL	80 litros
250 mL	200 litros
500 mL	400 litros
1 L	800 litros

Diluir na concentração indicada, agitar até completa homogeneização da calda. Banhar todo o corpo do animal, principalmente as regiões mais infestadas como: orelhas, base dos chifres, barbela, axilas, entre os membros, virilha e inserção da cauda. Utilizar aproximadamente 5 litros por bovino adulto.

Banho de imersão: carga: 1 litro do produto/1000 litros de água. Recarga: 1,5 litros do produto/1000 litros de água. Realizar pré-diluição do produto. Adicionar a primeira solução ao banheiro (tanque) de imersão de modo a obter uma solução final de acordo com as dosagens indicadas. Homogeneizar bem a solução.

SUÍNOS:
Pulverização: diluir o produto em água limpa obedecendo as seguintes dosagens:

Pulverização em suínos	
Produto	Água
25 mL	10 litros
100 mL	40 litros
250 mL	100 litros
500 mL	200 litros
1 L	400 litros

Utilizar quantidade suficiente para molhar todo o corpo do animal, ou seja, de 400 a 500 mL/animal adulto.

AVIÁRIOS E INSTALAÇÕES RURAIS: diluir 1 litro do produto/400 litros de água. Após a retirada das aves e da cama, fazer lavagem e desinfecção do galpão e em seguida realizar a pulverização com CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho em todo o local, utilizando bomba de alta pressão preferencialmente. Utilizar 100 litros do produto/120 m² de área. No caso de aviários, retornar as aves à granja após 48 horas.

INTERVALO ENTRE DOSES
O intervalo entre as aplicações pode variar de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho, ou a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES GERAIS
Seguir as dosagens recomendadas. Conservar unicamente no recipiente de origem sempre fechado e armazenar em local bem ventilado, entre 15 e 30°C, fora do alcance de crianças. Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Evitar a liberação do produto para o ambiente, caso necessário, descartar o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos, não reutilizar as embalagens vazias. Não contaminar rios e outros cursos de água, muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Utilizar pulverizadores (manuais ou motorizados) em bom estado de conservação, com boa pressão e previamente lavados, caso tenham sido utilizados com outro inseticida. Não guardar próximo de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Não fumar, comer ou beber durante a utilização do produto. Não misturar com óleos ou outros pesticidas. Em caso de derramamento, recolher o produto.

PRECAUÇÕES EM HUMANOS
Produto tóxico por ingestão. Nocivo em contato com a pele e por inalação, pode provocar irritação cutânea, irritação das vias respiratórias, irritação ocular grave e afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. Durante o uso do produto evitar respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis, lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho. Em caso de indisposição, mal-estar, consulte um médico. Se ingerido, não provocar o vômito, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

PRECAUÇÕES EM ANIMAIS
Não devem ocorrer intoxicações em bovinos e suínos quando utilizada a posologia recomendada e sob orientação do Médico Veterinário.

Pulverizar os animais em local aberto, sempre a favor do vento. Lavar o úbere das vacas tratadas antes da ordenha. Não aplicar em animais recém-nascidos, debilitados, doentes, exaustos, estressados, em fêmeas no terço final de gestação e animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto. Não aplicar sobre a pele úmida, lesionada ou quando esta estiver coberta por lama ou fezes. Não aplicar o produto em dias chuvosos ou nas horas de calor intenso. Em caso de intoxicação, procurar o Médico Veterinário, realizar tratamento sintomático e utilizar sulfato de atropina.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Inibidores da oxidase de função mista (ex: Butóxido de piperonila) suprimem a hidrólise de piretrinas e piretróides, potencializando sua atividade. Fármacos que ativam os receptores colinérgicos, relaxantes musculares periféricos e organoclorados devem ser evitados quando se fizer o uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados. A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

REAÇÕES ADVERSAS
Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos. Geralmente são seguros, mas eventualmente podem causar alergia, náusea, vômito, e cefaléia. Os organofosforados podem provocar efeitos adversos como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispnéia, fasciculação, ataxia e convulsões (em casos de má administração de doses ou intoxicações acidentais).

APRESENTAÇÕES
Frascos contendo 25 mL, 100 mL, 250 mL e 1 L.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.503/98 em 19/08/1998.

Responsável técnico:
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

Proprietário e Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150
Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Insc. Est.: 391.038.579.113

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 702 3551
www.biofarm.com.br

02020300.060625.NV2

Bula Cyperbio Plus

BIO020300

Data: 06/06/25

Programa: Corel



Papel OffSet 56g - Branco

136mm x 128mm

