

68,00 mm

ESTREPTOMICINA BIOFARM

**ANTIBIÓTICO
AMINOGLICOSÍDEO**

SUO VETERINÁRIO
Solução Injetável

FÓRMULA
Cada frasco contém:

Estreptomicina (sulfato)	6,25g*
Diluyente para injetável	20,0mL

*Equivalente a 5,0g de estreptomicina base.

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
 BOVINOS; ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
 LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "3" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.
 SUÍNOS; ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "30" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
 EQUINOS; ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
 A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES

Espécie Animal	Enfermidade	Micro-organismo
Bovinos	Mastite	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
	Enterite	<i>E. coli</i>
	Leptospirose	<i>Leptospira</i> spp.
Equinos	Pneumonia	<i>Pasteurella multocida</i>
	Leptospirose	<i>Leptospira</i> spp.
Suínos	Leptospirose	<i>Leptospira</i> spp.
	Poliartrite Infecciosa	<i>Haemophilus</i> spp.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Aplicar por via intramuscular, na dosagem de 1mL para cada 25Kg de peso corpóreo (10mg/Kg), independente da espécie animal, em intervalos de 12 horas, não devendo ultrapassar 7 dias.
 Não interromper o tratamento com **ESTREPTOMICINA BIOFARM** por, no mínimo 48 horas após a melhora clínica, ou a critério do Médico Veterinário.
 Após dissolvida, **ESTREPTOMICINA BIOFARM** deve ser utilizada imediatamente ou conservada a temperatura de 4°C, para uso posterior, até 24 horas após a sua diluição.

128,00 mm

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar por via intravenosa.
 Este produto não deve ser utilizado em animais com histórico de insuficiência renal.
 Em animais sedados ou anestesiados, não é aconselhável a administração de **ESTREPTOMICINA BIOFARM**, pois este medicamento potencializa os efeitos dos anestésicos gerais.
 O produto quando administrado por longos períodos pode acarretar lesão do nervo auditivo. A ototoxicidade é exacerbada pela administração simultânea de furosemida.
 Pode ocorrer aumento de nefrotoxicidade quando aplicado concomitantemente a outros agentes potencialmente nefrotóxicos.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 6,25g, acompanha ampola de diluyente com 20mL.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura
 sob nº 5.478/96 em 14/03/1996.

Responsável técnico:
 Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº6516

**Venda sob prescrição e aplicação
 sob orientação do Médico Veterinário.**

Fabricante:
 Vansil - Indústria Comércio e Representações Ltda.
 CNPJ - 50.472.547/0001-68

Proprietário:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
 Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710
 14.876-150 - Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
 CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113

SAC - Serviço de Atendimento
 ao Consumidor - 0800 702 3551
www.biofarm.com.br

BIOFARM
 Tecnologia em veterinária

0201.96.060122.NV1

Produto: Bula Estreptomicina
 Biofarm 6,25g

Código: BIO020196

Data 06/01/22

Programa: Corel



Papel Off Set 56g - Branco

68mm x 128mm

ALERTA: Qualquer mudança feita pelo fornecedor deverá ser submetida ao cliente e à CIPÓ. Todos os textos e informações legais deste material são de responsabilidade do cliente, inclusive os códigos do material, de barras e selos de entidades. A CIPÓ não se responsabilizará por erros após a impressão desta peça, uma vez aprovada pelo cliente.

