

105,00 mm

128,00 mm

LIDOFarm**ANESTÉSICO LOCAL****USO VETERINÁRIO**
Solução Injetável**FÓRMULA**

Cada 100mL contém:

Cloridrato de lidocaína	2,00g
Epinefrina	2,00mg
Veículo q.s.p.	100,00mL

"O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS E SUÍNOS TRATADOS".
"O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS".

Os anestésicos locais são substâncias que impedem a condução do impulso nervoso quando aplicados localmente no tecido, em concentrações apropriadas, sem prejuízo do controle das funções vitais.

A lidocaína age por meio do bloqueio da condução do impulso nervoso, diminuindo ou impedindo o aumento transitório na permeabilidade das membranas excitáveis ao sódio, que é produzido por uma discreta despolarização da membrana. Promove uma anestesia imediata e de duração longa e extensa. A epinefrina possui efeito vasoconstritor, permitindo o aumento do tempo anestésico.

INDICAÇÕES

LIDOFarm é um anestésico local, indicado para inibição da dor em uma determinada região, nos casos de tratamentos e procedimentos clínico-cirúrgicos.

MODO DE USAR

Administrar por via subcutânea, epidural ou infiltrações.

POSOLOGIA

Animais de grande porte (bovinos e equinos adultos): 5,0mL a 10,0mL.
Animais de médio porte (potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos): 2,5mL a 5,0mL.

A dose máxima permitida é de 9,0mg de lidocaína por kg de peso.

Alterações na posologia e modo de usar a critério do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES

Não deve ser usado em animais que apresentam hipersensibilidade a lidocaína e epinefrina, em animais em tratamento com sulfonamidas, animais com hipovolemia, bradicardia, descompensação cardíaca ou insuficiência cardíaca congestiva. Devido a presença da epinefrina o LIDOFarm deve ser evitado em cirurgias de extremidades ou circulações terminais.

INTOXICAÇÃO

A superdosagem de lidocaína deprime o sistema nervoso central e os efeitos colaterais incluem: sonolência, vertigem, parestesias, estado mental acelerado, coma e convulsões. O controle da respiração é essencial no tratamento do estágio tardio da intoxicação. O diazepam administrado pela via endovenosa é a droga de eleição tanto para a prevenção quanto para a parada das convulsões.

EFEITOS ADVERSOS

A presença da epinefrina poderá causar agitação, taquicardia, retardar a cicatrização de feridas, provocar edema ou necrose local. Em casos de altas doses, o animal poderá manifestar sinais de excitação, convulsão, hipóxia, acidose ou hipotensão arterial. A oxigenação tecidual faz com que a acidose e a hipóxia sejam corrigidas.

O uso de barbitúricos reduz a estimulação central. Não se deve empregar pentobarbital nas convulsões induzidas por lidocaína, pois potencializa a toxicidade desta substância.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 20mL e 50mL.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.038/92 em 22/07/1992.

Responsável técnico:

Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

**Venda sob prescrição e aplicação
sob orientação do Médico Veterinário.**

Proprietário e Fabricante:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150
Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 702 3551
www.biofarm.com.br



BIOFARM
Tecnologia em veterinária

020191.200522.NV2

Preto

Bula LIDOFarm 20mL e 50mL

BIO 020191

Data: 20/05/2022

Programa: Corel/Photoshop

Papel OffSet 90g - Branco

105mm x 128mm

Dobras: