

FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Abamectina	0,5g
Veículo q.s.p.	100,0mL

INDICAÇÕES

Para controle e tratamento de parasitas internos e externos dos bovinos. **Endoparasitas** - Nematódeos gastrointestinais: *Ostertagia ostertagi*, *Iytrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia* spp., *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus* spp., *Strongyloides papillosus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Trichuris* spp., Nematódeos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*. **Ectoparasitas** - Larvas de insetos: *Dermatobia hominis* (mosca vetora do berne), *Hypoderma* spp., *Haematobia irritans* (mosca-dos-chifres). Ácaros: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. Piolhos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytarnus*, *Solenopotes capillatus* e *Damaliniabovis*. Carrapatos: ajuda no controle do *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

POSOLOGIA

1mL de **ABACTIN Pour on** para cada 10Kg de peso corporal, equivalente a 500µg de Abamectina/Kg por animal ou a critério do Médico Veterinário.

	Peso (Kg por animal)	Volume de Abactin Pour on	Nº de doses na apresentação de 1 litro
Tabela de dosagem:	50	5mL	200
	100	10mL	100
	150	15mL	66
	200	20mL	50
	300	30mL	33
	400	40mL	25

MODO DE USAR

Produto pronto para uso. Aplicar o produto sobre a pele na região dorso lombar (fio do lombo), usando o frasco medidor graduado.

PRECAUÇÕES

É aconselhável o uso de luvas protetoras durante sua aplicação. Se ocorrer contato do produto com a pele ou mucosas do usuário, lavar as partes expostas com água e sabão e procurar o médico. Quando os olhos forem contaminados deve-se lavar com água abundante e procurar o médico. Uma vez utilizado o produto, manter o recipiente perfeitamente fechado. Se for ingerido acidentalmente, procurar o médico com a embalagem original. É conveniente sua aplicação em locais bem ventilados. Não aplicar em animais molhados, sujos ou com lesões na área de aplicação. Se chover nas próximas 2 horas após a aplicação a eficácia do produto pode ser diminuída. Produto inflamável, manter longe do fogo. Não utilizar a embalagem vazia. Descartar as embalagens vazias e restos de produto de forma adequada e segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

RESTRIÇÕES DE USO

Não administrar em fêmeas gestantes 28 dias antes do parto. Não aplicar em vacas produtoras de leite para consumo humano. Não usar o produto em animais com menos de 4 meses de idade. Utilizar este produto somente em bovinos na forma de Pour on.

PERÍODO DE CARÊNCIA

Suspender o tratamento 28 dias antes do abate para consumo humano.
Não administrar em fêmeas leiteiras em produção.

APRESENTAÇÃO: frasco contendo 1L.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.292/02 em 16/07/2002.

Responsável técnico:

Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

Proprietário e Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150 - Jaboticabal - SP
Fone: 16 3209-3500 - CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 702 3551 - www.biofarm.com.br



PART.:

FABR.:

VENC.:

ÁREA DE RESERVA
SEM BORDA



7 898416 700699