

BIOTOX

CARRAPATICIDA, SARNICIDA E PIOLHICIDA

USO VETERINÁRIO
Pulverização e Banho



FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Amitraz	12,5g
Veículo q.s.p	100,0mL

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "14" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "2" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES

Utilizado como carrapaticida, sarnicida e piolhica para bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Uso externo através de pulverização e banho de imersão, utilizado nas seguintes dosagens:

Bovinos - fazer a diluição de 40mL de **BIOTOX** para 20 litros de água, aplicando por pulverização no sentido contrário aos pelos num total de 5 litros por animal adulto.

Ovinos e Caprinos - aplicar em banho de imersão na proporção de 4 litros de **BIOTOX** para cada 1000 litros de água na carga e 4 litros de **BIOTOX** para cada 500 litros de água na recarga.

Suínos - fazer a diluição de 20mL de **BIOTOX** para cada 5 litros de água, banhando uma vez e repetindo após 14 dias.

PERÍODO DE CARÊNCIA

Não utilizar o leite para consumo antes de decorridos 2 dias após o último tratamento. Não abater os animais para consumo antes de decorridos 14 dias após o último tratamento.

PRECAUÇÕES

Evitar o tratamento de animais estressados ou cansados e nas horas mais quentes do dia. Evitar esforço físico ou estressar o animal após tratamento. Evitar o tratamento de fêmeas em estado adiantado de gestação, apesar de não se conhecer casos de aborto ou má formação de fetos. Ao operador evite o contato de **BIOTOX** com a pele, mãos, boca e olhos, lavando-os com sabão e água em abundância. Usar equipamentos de segurança (máscara, luvas, roupa protetora impermeável e botas). Não pulverizar contra o vento, bem como não utilizar pulverizadores manuais ou mecânicos com vazamentos. Em caso de ingestão acidental ou suspeita de intoxicação procurar imediatamente um médico. Não se conhece nenhum antídoto específico para o princípio ativo do **BIOTOX**, devendo-se fazer tratamento analéptico e sintomático tanto nos casos humanos como em animais. Sintomas como depressão do SNC e respiratória, queda de pressão sanguínea, distúrbios digestivos, cefaléia, agitação corporal, tremores e convulsões são causados por intoxicação pelo componente ativo do **BIOTOX**. Não utilizar as embalagens vazias para outros fins.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 20mL, 40mL, 250mL e 1L.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.424/96 em 26/01/1996.

Responsável técnico:
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

Proprietário e Fabricante:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150

Jaboticabal - SP- Fone: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço
de Atendimento
ao Consumidor
0800 702 3551
www.biofarm.com.br



BIOFARM
Tecnologia em veterinária