

CARRAPATOX

CARRAPATICIDA E SARNICIDA

USO VETERINÁRIO
Pulverização e Banho



FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Cipermetrina	10,0g
Veículo q.s.p.	100,0mL

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "20" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "24" HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.
EQUINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "20" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES

Carrapaticida e sarnicida de uso externo para bovinos, equinos, caprinos e ovinos. Em instalações rurais no combate a *Stomoxys calcitrans* e *Musca domestica*.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

CARRAPATOX deve ser diluído em água. Após a diluição, agitar até formar uma calda homogênea. Utilizar a calda para pulverização.

Pulverização:

Equinos, Ovinos e Caprinos - diluir 20mL de **CARRAPATOX** para 20 litros de água, ou 1 litro do produto para 1000 litros de água (1:1000).

Bovinos - pulverizar todo o corpo do animal, especialmente as regiões mais afetadas como: barbela, entre pernas, orelhas, região do perineo e base da cauda. Utilizar aproximadamente 5 litros por animal adulto e seguir diluição conforme tabela abaixo:

CARRAPATOX	QUANTIDADE DE ÁGUA	NÚMERO DE ANIMAIS
20mL	20L	04
40mL	40L	08
100mL	100L	20

Instalações rurais - diluir 20mL de **CARRAPATOX** para 4 litros de água. Pulverizar estruturas como: pisos, paredes, teto e corredores. Utilizar 1 litro para cada 10 - 15m² de área conforme tabela abaixo:

CARRAPATOX	QUANTIDADE DE ÁGUA	ÁREA EM m ²
20mL	4L	40/60
40mL	8L	80/120
60mL	12L	120/180

Em pulverização nos animais ou nas instalações rurais, se necessário fazer reaplicações.

PRECAUÇÕES

- Manter **CARRAPATOX** ao abrigo da luz.
- Não aplicar o produto em dias chuvosos ou de calor muito intenso.
- Evitar contato do produto com a pele e mucosas do corpo. Não pulverizar contra o vento.
- Não reaproveitar a embalagem vazia.
- Não misturar outros produtos ao **CARRAPATOX**.
- Produto tóxico para abelhas e peixes.
- Não lançar o produto em mananciais, rios e lagos.
- Não fumar nem ingerir alimentos durante a aplicação.
- Caso o produto atinja os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente durante 10 minutos, no mínimo.

EM CASOS DE INTOXICAÇÃO ACIDENTAL EM HUMANOS

Em caso de ingestão acidental ou suspeita de intoxicação, procurar imediatamente um médico.

PARA O MÉDICO

Sintomatologia: Salivação excessiva, respiração rápida e difícil com depressão.

Antídoto: Não existe, deve-se fazer tratamento sintomático do colapso com anti-histamínico.

PARA O VETERINÁRIO

Utilizar terapêutica semelhante.

Categoria Toxicológica: II.

Ação Tóxica: hipersensibilizante e irritante das mucosas.

Grupo químico: ester do Ácido Crisantêmico.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 20mL, 100mL, 250mL e 1L.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.824/94 em 02/09/1994.

Responsável técnico:
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516



INFLAMÁVEL

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário



Proprietário e Fabricante:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150

Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 702 3551
www.biofarm.com.br



BIOFARM
Tecnologia em veterinária



020206.220120.NV1