emergência nos casos de intoxicação por organofosforados.

Nos animais: não devem ocorrer intoxicações em bovinos e suínos quando utilizada a posologia recomendada e sob orientação do Médico Veterinário. Em caso de intoxicação, procurar o Médico Veterinário, realizar tratamento sintomático e utilizar sulfato de atropina.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A utilização simultânea de outros produtos a base de organofosforados e carbamatos deve ser avaliada pelo Médico Veterinário para evitar intoxicações. Inibidores da oxidase de função mista (ex: Butóxido de Piperonila) suprem a hidrólise de piretrinas e piretróides, potencializando sua atividade. Fármacos que ativam os receptores colinérgicos, relaxantes musculares periféricos e organoclorados devem ser evitados quando se fizer o uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados. A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 1L e 2L.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.490/00 em 05/10/2000.

Responsável técnico:
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

020305.230921.NV2

Proprietário e Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150
Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113

PRODUTO BRASILEIRO

CUIDADO VENENO

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 702 3551
www.biofarm.com.br

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

CYPERBIO PLUS POUR ON

ECTOPARASITICIDA DE AMPLO ESPECTRO

USO VETERINÁRIO
Pour On

FÓRMULA
Cada 100mL contém:

Cipermetrina	6,0g
Clorpirifós	7,0g
Butóxido de Piperonila	0,5g
Veículo q.s.p.	100,0mL

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "3" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.
SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

INDICAÇÕES

CYPERBIO PLUS Pour On é indicado no controle dos principais ectoparasitas de bovinos e suínos. Contém em sua formulação o Butóxido de Piperonila, que atua como potencializador da Cipermetrina. Controla os seguintes ectoparasitas:

Bovinos: Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Amblyomma sculptum*, *Amblyomma* spp. e *Anocentor nitens*. **Bernes:** larvas de *Dermatobia hominis*. **Moscas:** *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Dermatobia hominis*, *Musca autumnalis*, *Musca* spp., *Tabanus* spp. e *Haematobia irritans* (mosca-dos-chifres).

Piolhos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* e *Damalinia bovis*. **Sarnas:** *Sarcoptes scabiei* var. *bovis, Psoroptes natalensis* e *Chorioptes bovis*.

Suínos: Bernes: larvas de *Dermatobia hominis*. **Moscas:** *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Musca* spp., *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis* e *Musca autumnalis*. **Sarna:** *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

CYPERBIO PLUS Pour On deve ser aplicado sobre o dorso do animal, iniciando-se do meio do pescoço até a inserção da cauda.

Bovinos: 10mL/100Kg de peso corporal, obedecendo a tabela abaixo:

Peso do Animal	Dose
100Kg	10mL
200Kg	20mL
300Kg	30mL
400Kg	40mL
500Kg	50mL

Para animais acima de 500Kg, a dose máxima recomendada é de 50mL.

Suínos: 5mL/100Kg de peso corporal, obedecendo a tabela abaixo:

Peso do Animal	Dose
50Kg	2,5mL
100Kg	5mL
150Kg	7,5mL
200Kg	10mL
250Kg	12,5mL
300Kg	15mL

INTERVALO ENTRE DOSES

O intervalo entre as aplicações pode variar de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho, ou a critério do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicar em animais recém-nascidos, bovinos com peso inferior a 100 kg, suínos com peso inferior a 50 kg, animais debilitados, doentes, exaustos, estressados e em fêmeas no terço final de gestação. Não aplicar em pele lesionada. Não aplicar sobre pele úmida, ou quando esta estiver coberta por lama ou fezes. Não aplicar o produto em dias chuvosos ou nas horas de calor intenso. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem do produto fechada. Não reutilizar as embalagens vazias. Seguir as dosagens recomendadas. Não guardar próximo de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Não fumar, comer ou beber durante a utilização do produto. Lavar as mãos e as partes expostas após a utilização do produto. Não misturar com óleos ou outros pesticidas. Não contaminar rios e outros cursos de água. Produto tóxico para peixes.

REAÇÕES ADVERSAS

Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos. Geralmente são seguros, mas eventualmente podem causar alergia, náusea, vômito e cefaléia. Os organofosforados podem provocar efeitos adversos como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispnéia, fasciculação, ataxia e convulsões (em casos de má administração de doses ou intoxicação acidental).

No homem: se o produto atingir os olhos do manipulador, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos. Se o produto entrar em contato com a pele, retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Se ocorrer intoxicação acidental, procurar imediatamente o Médico, realizar tratamento sintomático e utilizar sulfato de atropina, que é o antídoto de