

CYPERBIO PLUS

Pulverização e Banho

USO VETERINÁRIO
Pulverização e Banho



ECTOPARASITICIDA DE
AMPLO ESPECTRO

FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Cipermetrina	15,0g
Clorpirifós	25,0g
Butóxido de piperonila	1,5g
Veículo q.s.p.	100,0mL

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "3" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.
SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

INDICAÇÕES

CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho é indicado no controle dos seguintes ectoparasitas:

Bovinos: Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Amblyomma cajennense* e *Anocentor nitens*. **Bernes:** larvas de *Dermatobia hominis*. **Moscas:** *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Dermatobia hominis*, *Musca autumnalis*, *Musca* spp., *Tabanus* spp. e *Haematobia irritans* (Mosca dos chifres). **Piolhos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* e *Damalinia bovis*. **Sarnas:** *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Psoroptes natalensis* e *Chorioptes bovis*.

Suínos: **Bernes:** larvas de *Dermatobia hominis*. **Moscas:** *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Musca* spp., *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis* e *Musca autumnalis*. **Sarna:** *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

Aviários e instalações rurais: indicado no controle de parasitas como *Alphitobius diaperinus* (besouro cascudinho adulto) e piolhos dos gêneros *Columbicola* spp., *Cuclotogaster* spp., *Goniocotes* spp., *Goniodes* spp., *Holomenopon* spp., *Lipeurus* spp., *Menacanthus* spp. e *Menopon* spp. - adultos.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho é um produto de uso tópico, que pode ser utilizado por meio de pulverização ou banho de imersão.

BOVINOS:

Pulverização: diluir o produto em água limpa obedecendo as seguintes dosagens:

Pulverização em bovinos	
Produto	Água
25mL	20 litros
100mL	80 litros
250mL	200 litros
500mL	400 litros
1L	800 litros

Diluir na concentração indicada, agitar até completa homogeneização da calda. Banhar todo o corpo do animal, principalmente as regiões mais infestadas como: orelhas, base dos chifres, barbela, axilas, entre os membros, virilha e inserção da cauda. Utilizar aproximadamente 5 litros por bovino adulto.

Banho de imersão: carga: 1 litro do produto/1000 litros de água. Recarga: 1,5 litros do produto/1000 litros de água. Realizar pré-diluição do produto. Adicionar a primeira solução ao banheiro (tanque) de imersão de modo a obter uma solução final de acordo com as dosagens indicadas. Homogeneizar bem a solução.

SUÍNOS:

Pulverização: diluir o produto em água limpa obedecendo as seguintes dosagens:

Pulverização em suínos	
Produto	Água
25mL	10 litros
100mL	40 litros
250mL	100 litros
500mL	200 litros
1L	400 litros

Utilizar quantidade suficiente para molhar todo o corpo do animal, ou seja, de 400 a 500mL/animal adulto.

AVIÁRIOS E INSTALAÇÕES RURAIS: diluir 1 litro do produto/400 litros de água. Após a retirada das aves e da cama, fazer lavagem e desinfecção do galpão e em seguida realizar a pulverização com **CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho** em todo o local, utilizando bomba de alta pressão preferencialmente. Utilizar 100 litros do produto/120m² de área. No caso de aviários, retornar as aves à granja após 48 horas.

INTERVALO ENTRE DOSES

O intervalo entre as aplicações pode variar de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho, ou a critério do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicar em animais recém-nascidos, debilitados, doentes, exaustos, estressados e em fêmeas no terço final de gestação. Não aplicar em pele lesionada. Não aplicar sobre a pele úmida, ou quando esta estiver coberta por lama ou fezes. Não aplicar o produto em dias chuvosos ou nas horas de calor intenso. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem do produto fechada. Não reutilizar as embalagens vazias. Seguir as dosagens recomendadas. Utilizar pulverizadores (manuais ou motorizados) em bom estado de conservação, com boa pressão e previamente lavados, caso tenham sido utilizados com outro inseticida. Pulverizar os animais em local aberto, sempre a favor do vento. Não guardar próximo de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Não fumar, comer ou beber durante a utilização do produto. Não misturar com óleos ou outros pesticidas. Não contaminar rios e outros cursos de água. Produto tóxico para peixes. Lavar o úbere das vacas tratadas antes da ordenha.

REAÇÕES ADVERSAS

Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos. Geralmente são seguros, mas eventualmente podem causar alergia, náusea, vômito, e cefaléia. Os organofosforados podem provocar efeitos adversos como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispnéia, fasciculação, ataxia e convulsões (em casos de má administração de doses ou intoxicações acidentais).

No homem: se o produto atingir os olhos do manipulador, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos. Se o produto entrar em contato com a pele, retirar as roupas contaminadas, e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Se ocorrer intoxicação acidental, procurar imediatamente o Médico, realizar tratamento

sintomático e utilizar sulfato de atropina, que é o antídoto de emergência nos casos de intoxicação por organofosforados.

Nos animais: não devem ocorrer intoxicações em bovinos e suínos quando utilizada a posologia recomendada e sob orientação do Médico Veterinário. Em caso de intoxicação, procurar o Médico Veterinário, realizar tratamento sintomático e utilizar sulfato de atropina.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Inibidores da oxidase de função mista (ex: Butóxido de piperonila) suprem a hidrólise de piretrinas e piretróides, potencializando sua atividade. Fármacos que ativam os receptores colinérgicos, relaxantes musculares periféricos e organoclorados devem ser evitados quando se fizer o uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados. A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 25mL, 100mL, 250mL, e 1L.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.503/98 em 19/08/1998.

Responsável técnico:

Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação
do Médico Veterinário.

Proprietário e Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150
Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Insc. Est.: 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento
ao Consumidor - 0800 702 3551
www.biofarm.com.br



BIOFARM
Tecnologia em veterinária