ESTREPTOMICINA BIOFARM

USO VETERINÁRIO

Solução Injetável

FÓRMULA

Cada frasco contém:

Estreptomicina (sulfato)	6,25g*
Diluente: Água Bidestilada Estéril	20,0mL

***Equivalente a 5,0g de estreptomicina base.**

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

"ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO."

"LEITE – O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "3" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO".

SUÍNOS:

ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "30" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS:

"ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "10" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO."

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES

Espécie Animal	Enfermidade	Microorganismo
Bovinos	Mastite	*Pseudomonas aeruginosa*
	Enterite	*E. coli*
	Leptospirose	*Leptospira* spp.
Equídeos	Pneumonia	*Pasteurella multocida*
	Leptospirose	*Leptospira* spp.
Suínos	Leptospirose	*Leptospira* spp.
	Poliartrite Infecciosa	*Haemophilus* spp.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Aplicar por via intramuscular, na dosagem de 1mL para cada 25Kg de peso corpóreo (10mg/Kg), independente da espécie animal, em intervalos de 12 horas, não devendo ultrapassar 7 dias.

Não interromper o tratamento com **ESTREPTOMICINA BIOFARM** por, no mínimo 48 horas após a melhora clínica, ou a critério do Médico Veterinário.

Após dissolvida, **ESTREPTOMICINA BIOFARM** deve ser utilizada imediatamente ou conservada a temperatura de 4ºC, para uso posterior, até 24 horas após a sua diluição.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar por via intravenosa.

Este produto não deve ser utilizado em animais com histórico de insuficiência renal.

Em animais sedados ou anestesiados, não é aconselhável a administração de **ESTREPTOMICINA BIOFARM** pois, este medicamento potencializa os efeitos dos anestésicos gerais.

O produto quando administrado por longos períodos pode acarretar lesão do nervo auditivo. A ototoxidade é exacerbada pela administração simultânea de furosemida.

Pode ocorrer aumento de nefrotoxidade quando aplicado concomitantemente a outros agentes potencialmente nefrotóxicos.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 6,25g, acompanha ampola de diluente com 20mL.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.478/96 em 14/03/1996.

Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e aplicação do Médico Veterinário.

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

020196.210217.V1

Fabricante:
Vansil - Indústria Comércio e Representações Ltda.
CNPJ - 50.472.547/0001-68

Proprietário:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710
14.876-150 - Jaboticabal - SP
Fone/Fax: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Insc. Est. 391.038.579.113
www.biofarm.com.br
SAT - Serviço de Atendimento Técnico
0800 702 3551

PRODUTO BRASILEIRO