

ADVERTÊNCIAS E CONTRAINDICAÇÕES

SPOT Plus deve ser utilizado exclusivamente por uso tópico em cães e **NÃO deve ser utilizado em animais com menos de 8 semanas de idade e abaixo de 1Kg de peso corporal.**

É necessário que a pelagem do animal esteja totalmente seca antes de utilizar o **SPOT Plus**. Em caso de banhos frequentes (semanais) utilizando-se xampus ou sabonetes, poderá haver redução da permanência e eficácia do produto. A toxicidade dos componentes do **SPOT Plus** é bastante baixa quando comparada a outros ectoparasiticidas. Em caso de intoxicação, procure imediatamente o Médico Veterinário, os animais podem apresentar a síndrome "T", caracterizada por hiperexcitação, agressividade, tremores, fraqueza e resposta de sobressalto. Fazer tratamento sintomático, pois não há antídoto específico. Remover o excesso do produto com água e sabão neutro. Os sintomas de excitação podem ser controlados com benzodiazepínicos ou barbitúricos, no caso de convulsão. Carvão ativado, associado a um catártico osmótico, como o sulfato de sódio ou de magnésio, que auxiliam na inativação e remoção do piretróide do aparelho digestório.

NÃO UTILIZAR EM GATOS.

EFEITOS ADVERSOS

As principais reações adversas devido à ingestão acidental do produto são: vômitos, náuseas, tremores e sialorreia (salivação excessiva). O uso tópico geralmente não causa efeitos colaterais quando utilizado na dose recomendada.

regulador do crescimento dos parasitas. Sua utilização impede a evolução das formas imaturas dos parasitas, portanto não ocorrerá a evolução de ovos, larvas, ninfas e pupas, auxiliando no controle populacional dos parasitas. Recomenda-se o controle dos parasitas no ambiente, com produtos adequados, para evitar reinfestações no animal.

INDICAÇÕES

SPOT Plus é indicado no controle e prevenção das infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) nos cães. Auxilia no tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*Leishmania chagasi*).

MODO DE USAR

SPOT Plus é um produto de uso tópico, pronto para uso e de fácil aplicação.

1. Retire a ponta da pipeta na linha demarcada (Figura 1);
2. Afaste os pelos da região dorsal do animal;
3. Posicione a pipeta na região entre a nuca e as escápulas e aplique todo o conteúdo da pipeta sobre a pele ao longo do dorso, evitando que o produto escorra, conforme sequência demonstrada na ilustração (Figura 2).

APRESENTAÇÕES

Pipetas contendo 1,5mL, 3,0mL, 6,0mL e 9,0mL.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.880/14 em 11/07/2014.

Responsável técnico:
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário



Em caso de intoxicação humana entrar em contato com o CEATOX 0800 0148110 ou (11) 2661-8800 / 2661-8571.



Proprietário e Fabricante:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150

Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62

Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 702 3551
www.biofarm.com.br



020296.180221.NV3

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

SPOT Plus

CARRAPATICIDA | PULGICIDA

USO VETERINÁRIO
Uso Tópico | Spot-On



FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Permetrina	37,5g
Metopreno	2,0g
Butóxido de piperonila	1,3g
Veículo q.s.p.	100,0mL

SPOT Plus é a associação de 3 princípios ativos onde o sinergismo entre os fármacos torna a fórmula eficaz no controle e prevenção de pulgas, carrapatos e como repelente de mosquitos, permitindo que o animal seja protegido por cerca de 4 semanas após a aplicação. A Permetrina e o Butóxido de piperonila atuam por contato, provocando a morte dos parasitas ao interferir na sua transmissão nervosa. O Metopreno é um

PRECAUÇÕES DE USO

- Utilizar luvas protetoras para aplicação do produto;
- Não tratar animais debilitados, estressados, doentes e filhotes com menos de 8 semanas de idade e abaixo de 1Kg de peso corporal;
- Separar gatos e demais cães de animais recém tratados;
- Não deixar os animais lambem o local de aplicação do produto;
- Ao tratar vários animais, recomenda-se deixá-los separados para que não lambam o produto aplicado no outro animal;
- A exposição do animal a água (banhos ou chuva) antes ou após o tratamento pode reduzir a eficácia do produto;
- Respeitar um intervalo mínimo de 05 dias entre o tratamento e próximo banho do animal;
- Após aplicação do produto evitar contato sem luvas com o animal até que a pele esteja seca;
- Evitar o contato do produto com os olhos e boca, caso ocorra acidentalmente, lavar imediatamente com água em abundância;
- Manter o produto em sua embalagem original;
- Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene;
- Não utilizar a embalagem vazia, descartá-la de forma segura evitando contaminação ambiental;
- Não jogar restos do produto ou a embalagem vazia em fontes de água, rios, lagos, açudes, canalizações, esgotos, mananciais etc;
- Tóxico para peixes, abelhas e pássaros;
- Em casos de sensibilidade, irritação ou desconforto, banhar o animal com água e sabão neutro para remoção do produto. Procurar o Médico Veterinário.





Figura 2 - Região entre a nuca e as escápulas - início da aplicação (1)
Região dorsal - extensão da aplicação (2 e 3)

POSOLOGIA

A dose deve ser aplicada de acordo com o peso do animal, conforme descrito abaixo:

Cães até 10Kg	1 pipeta contendo 1,5mL
Cães de 10 a 20Kg	1 pipeta contendo 3,0mL
Cães de 20 a 40Kg	1 pipeta contendo 6,0mL
Cães acima de 40Kg	1 pipeta contendo 9,0mL

Recomenda-se que o tratamento seja repetido a cada 4 semanas para melhor controle e prevenção de pulgas, carrapatos e mosquitos.

Não repetir o tratamento com menos de 07 dias.