

Tecnologia em veterinária  
**BIOFARM**

USO VETERINÁRIO  
Solução Injetável

ENDOPARASITICIDA  
PARA BOVINOS **10**

**RICOFarm**

www.biofarm.com.br

**RICOFarm**

ENDOPARASITICIDA  
PARA BOVINOS

**10**

USO VETERINÁRIO  
Solução Injetável



Conteúdo: **250mL**

**BIOFARM**  
Tecnologia em veterinária

**RICOFarm**

ENDOPARASITICIDA  
PARA BOVINOS

**10**

FÓRMULA  
Cada 100mL contém:

Sulfóxido de albendazol	10,0g
Veículo q.s.p.	100,0mL

**INDICAÇÕES**  
RICOFarm 10 é indicado no tratamento de infecções parasitárias pulmonares e gastrointestinais de bovinos, causadas por nematódeos, cestódeos e trematódeos. Indicado no tratamento de infecções causadas por helmintos dos gêneros *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Dictyocaulus* spp., *Bunostomum* spp., *Nematodirus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Trichuris* spp., *Strongyloides* spp., *Moniezia* spp., *Capillaria* spp. e *Fasciola* spp.. Também indicado no tratamento de cisticercose (*Cysticercus bovis*).

**MODO DE USAR**  
Aplicar por via subcutânea, preferencialmente na tábua do pescoço do animal.

**POSOLOGIA**  
Aplicar em dose única conforme peso corpóreo do animal. Doses: 1mL/40Kg no tratamento de nematódeos, cestódeos e trematódeos; 1,5mL/40Kg no tratamento de *Ostertagia* tipo II e 2mL/40Kg no tratamento da *Fasciola hepatica*. No caso de cisticercose, administrar 1mL/40Kg em 3 aplicações com intervalos de 30 dias. Doses superiores a 10mL devem ser subdivididas e aplicadas em locais diferentes.

**PRECAUÇÕES**  
Não deve ser aplicado por via intramuscular ou endovenosa. Não aplicar em animais com febre, estado de estresse ou debilitados. Não jogar os frascos do produto em lagos ou rios (pode prejudicar a vida aquática). Produtos injetáveis podem ocasionar raros casos de reações de hipersensibilidade individual. Não usar em vacas lactantes. Não usar em fêmeas leiteiras na idade de reprodução, durante os primeiros 45 dias de prenhez ou 45 dias depois do afastamento do touro. Não reutilizar a embalagem vazia.

**EFETOS TÓXICOS**  
Os principais efeitos tóxicos estão relacionados com a teratogenicidade. O parbendazol, cambendazol, albendazol e oxfendazol são considerados compostos que causam má formação fetal. Estes efeitos são mais observados em ovinos.

**APRESENTAÇÕES**  
Frascos contendo 250mL e 500mL.

**RICOFarm**

ENDOPARASITICIDA  
PARA BOVINOS

**10**

USO VETERINÁRIO  
Solução Injetável



Conteúdo: **250mL**

**BIOFARM**  
Tecnologia em veterinária

**RICOFarm**

ENDOPARASITICIDA  
PARA BOVINOS

**10**

Reserva de Verniz  
Sem Contorno

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.182/02 em 20/03/2002.

Responsável técnico:  
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e aplicação  
sob orientação do Médico Veterinário.



Proprietário e Fabricante:  
**BIOFARM QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.**  
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710  
14.876-150 - Jaboticabal - SP  
Fone: 16 3209-3500  
CNPJ: 00.256.591/0001-62  
Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  
0800 702 3551  
www.biofarm.com.br



100054.140121.NV1