

#### FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Closantel	12,5g
Veículo q.s.p.	100,0mL

#### INDICAÇÕES

Tratamento e controle das formas adultas da *Fasciola hepática*, *Fasciola gantica* e nematódeos hematófagos como *Haemonchus* sp. Também é efetivo contra os estágios larvais do *Oestrus ovis*, *Bunostomum*, *Capilaria bovis*, *esophagostomum radiatum*, *Oesophagostomum columbianum*, *Gaigeria achyscelis*, *Chabertia ovina* e *Dictyocaulus viviparus*. Combate larvas de oscas, bernes (*Dermatobia hominis*) e miíases prevenindo as reinfestações. Inge outros parasitas externos como ácaros da sarna ovina e piolhos dos ovinos, ovinos e caprinos. Quando absorvido determina um poder residual que assegura uma proteção contra reinfestações por várias semanas, pois fixa-se às oteínas plasmáticas, aumentando o intervalo entre as dosificações.

#### MODO DE USAR E POSOLOGIA

Aplicação por via subcutânea, a critério do Médico Veterinário.

##### bovinos e caprinos:

endoparasitas: 1,0mL a cada 25kg de peso, ou seja, 5mg por kg de peso.  
ectoparasitas: 1,5mL a cada 25kg de peso, ou seja, 7,5mg por kg de peso.

##### ovinos:

endoparasitas: 1,0mL a cada 35kg de peso, ou seja, 3,57mg por kg de peso.  
ectoparasitas: 1,0mL a cada 25kg de peso, ou seja, 5mg por kg de peso.

**bs: Doses acima de 6mL devem ser aplicadas em pelo menos dois locais ferentes.**

#### INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

Coadjuvante no controle das infestações por *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (carrapato do bovino).

#### PERÍODO DE CARÊNCIA

Não utilizar o leite e a carne dos animais para o consumo humano antes de completar 30 dias após o tratamento.

#### CONTRAINDICAÇÃO

Não deve ser utilizado em fêmeas 28 dias antes da parição.

#### APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 200mL.

# ZANTEC

## ANTIPARASITÁRIO DE AMPLO ESPECTRO

### USO VETERINÁRIO | Injetável



**ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEQUENTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:**  
**BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "30" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**  
**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO "30" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**  
**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**BIOFARM**  
Tecnologia em veterinária

## CONTÉM: 200mL

PART.:

FABR.:

VENC.:

RESERVA DE VERNIZ  
SEM CONTORNO

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.393/96 em 19/01/1996.

#### Responsável técnico:

Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

**Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.**



#### Proprietário e Fabricante:

**BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.**

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150

Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62

Insc. Est. 391.038.579.113

www.biofarm.com.br

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 702 3551

