

128,00 mm
136,00 mm

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses, desde que mantido em condições adequadas de armazenamento e esterilidade.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 000235-6.000013 em 27/04/2020.

Responsável técnico:
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Proprietário e Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150
Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Insc. Est.: 391.038.579.113

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 702 3551
www.biofarm.com.br

EMBALAGEM RECICLÁVEL

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

EPREMIUM[®] 5%

ENDECTOCIDA PARA BOVINOS

EPRINOMECTINA A 5%

USO VETERINÁRIO
Solução Injetável

FÓRMULA
Cada 100 mL contém:

Eprinomectina	5,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: CARÊNCIA ZERO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES

A eprinomectina é um derivado semissintético das avermectinas, que são um grupo de lactonas macrocíclicas quimicamente relacionadas, produzidas pela fermentação de um fungo habitante do solo, o *Streptomyces avermitilis*. As avermectinas são amplamente utilizadas na medicina veterinária, e, desde a introdução da ivermectina na terapêutica antiparasitária, busca-se associar a eficácia destes princípios ativos com baixos períodos de carência. Neste particular, a eprinomectina se destaca por seu baixo perfil residual, o que possibilita uma maior segurança no uso de endectocidas em rebanhos destinados à produção de carne e leite.

EPREMIUM 5% é um endectocida para bovinos, indicado para o tratamento de nematódeos gastrointestinais, carrapato, berne e mosca-dos-chifres.

Os parasitas para os quais o uso de **EPREMIUM 5%** é indicado são: **Nematódeos gastrointestinais:** Altamente eficaz contra o estágio adulto de: *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Trichostrongylus axei* e *Oesophagostomum radiatum*. Eficaz contra o estágio adulto de *Cooperia pectinata*.
Carrapato: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*. **Berne:** *Larvas de Dermatobia hominis*. **Mosca-dos-chifres:** *Haematobia irritans*.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Aplicar **EPREMIUM 5%** pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal (0,02 mL/kg), conforme o quadro abaixo:

Peso (kg)	Dose (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL

Animais acima de 500 kg = 1 mL a cada 50 kg

Dosagem equivalente a 1,0 mg de eprinomectina por kg de peso corporal.

Recomenda-se que volumes maiores que 10 mL, caso necessário, sejam divididos em dois ou mais pontos de aplicação. Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidades animais, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência parasitária. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar o produto por via intravenosa ou intramuscular. O produto não deve ser utilizado em animais que apresentam hipersensibilidade à eprinomectina. Nos estudos realizados com o **EPREMIUM 5%**, o produto se mostrou seguro para o tratamento antiparasitário de bovinos com idade acima de 07 dias de vida.

Não misturar a outros produtos.
Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

PRECAUÇÕES EM ANIMAIS

Obedecer as dosagens recomendadas para uso do produto. Não foram realizados estudos de segurança com fêmeas prenhes.

PRECAUÇÕES EM HUMANOS

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo completo do produto.

Cuidado! Pode ser irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, e se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber.

Não armazenar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Avermectina;
Ingrediente ativo: Eprinomectina;
Ação tóxica: Estimula a liberação do ácido GABA, provocando paralisia;
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático.

REAÇÕES ADVERSAS

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer, como o aparecimento de edema leve e transitório no local da administração, geralmente sem a necessidade de tratamento.

Em caso de reação, procure imediatamente um Médico Veterinário. Em caso de necessidade de tratamento, indica-se o tratamento sintomático.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 50 mL e 500 mL.

Bula EPREMIUM 5%

BIO 020430

Data: 20/05/24

Programa: Corel

PRETO

Papel OffSet 56g - Branco

136mm x 128mm

Dobras:

