

204,00 mm

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ferro, alumínio, cálcio, zinco e manganês diminuem a concentração sérica e biodisponibilidade das tetraciclina devido à capacidade desta de formar quelatos com íons metálicos. Da mesma forma, a presença de anti-histamínicos H₁ pode diminuir a absorção do ativo. Neste caso deve-se manter um intervalo de duas horas ou mais entre a administração desses fármacos. Apesar de a doxiciclina ter uma afinidade relativamente baixa para íons de cálcio, o intervalo de uma a duas horas também é recomendado antes ou depois da administração de produto contendo cálcio. As tetraciclina podem antagonizar o efeito de antibióticos bactericidas, como as penicilinas e as cefalosporinas, principalmente dos antibióticos β-lactâmicos, não sendo recomendado seu uso concomitante. As tetraciclina podem diminuir a atividade da protrombina no plasma, portanto pacientes em tratamento com anticoagulantes podem precisar de reajuste de dose. Pacientes que fazem uso de insulina devem ser monitorados, pois tetraciclina podem reduzir a dose necessária em pacientes com diabetes *mellitus*. A nefrotoxicidade causada pelo anestésico metoxiflurano pode ser exacerbada quando utilizada junto às tetraciclina. As tetraciclina, administradas junto à digoxina podem aumentar sua biodisponibilidade e toxicidade. Barbitúricos e carbamazepina reduzem a meia vida biológica da doxiciclina. A administração concomitante de tetraciclina com teofilina pode exacerbar os efeitos sobre o trato gastrointestinal.

APRESENTAÇÃO

1 blister com 14 comprimidos revestidos.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 000235-6.000016 em 20/08/1999.

Responsável técnico:
Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e administração sob orientação do Médico Veterinário.

Proprietário e Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150
Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Insc. Est. 391.038.579.113

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

BIOXIN[®]
50 mg

ANTIMICROBIANO À BASE DE DOXICICLINA PARA CÃES E GATOS

USO VETERINÁRIO
Oral - Comprimidos

FÓRMULA

Cada comprimido revestido de 250 mg contém:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Doxiciclina (hclato)* | 50,00 mg |
| Excipiente q.s.p. | 250,00 mg |

*equivalente a 57,70 mg de Doxiciclina hclato.

INDICAÇÕES

BIOXIN[®] 50 mg é um antimicrobiano à base de doxiciclina e pertence à classe das tetraciclina. Com ação bacteriostática, **BIOXIN[®] 50 mg** é indicado para o tratamento de diversas infecções que acometem cães e gatos, causadas por *Bordetella bronchiseptica*, *Corynebacterium auriscanis*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Fusobacterium nucleatum*, *Haemophilus haemoglobinophilus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Porphyromonas gulae*, *Salmonella Typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus pseudointermedius*, *Streptococcus canis* e *Streptococcus dysgalactiae*.

260,88 mm

MODO DE USAR E POSOLOGIA

BIOXIN[®] 50 mg deve ser administrado exclusivamente por via oral, de acordo com a dosagem preconizada para o seu peso corporal, não havendo a necessidade de jejum prévio ou qualquer alteração na dieta para a sua administração.

Dosagens: **BIOXIN[®] 50 mg** deve ser administrado de acordo com a indicação abaixo:

| BIOXIN [®] 50 mg | Peso corporal |
|---------------------------|---------------|
| 1 comprimido de 250 mg | 5 kg |

A dose terapêutica da doxiciclina é de 10 mg/kg de peso corporal, devendo ser administrada uma vez ao dia por sete dias consecutivos. O fato de o animal estar alimentado ou em jejum não interferirá no tratamento, pois estudos demonstram que a doxiciclina não tem sua absorção prejudicada quando administrada com alimentos.

FARMACODINÂMICA

As tetraciclina são antimicrobianas bacteriostáticas. Sua ação se deve a sua ligação a um sítio na subunidade 30S do ribossomo bacteriano, bloqueando a ligação do aminoacil-t-RNA no sítio A do ribossomo, impedindo a incorporação de aminoácidos que constituem a cadeia peptídica e, conseqüentemente, inibindo a síntese proteica.

FARMACOCINÉTICA

Cerca de 95% da doxiciclina é absorvida após administração oral e devido a sua alta lipossolubilidade, alcança excelentes níveis de distribuição e penetração na maioria dos líquidos e tecidos orgânicos.

Também possui maior capacidade de ligação a proteínas plasmáticas do que outras tetraciclina, resultando em uma meia-vida prolongada em humanos e animais.

A doxiciclina é eliminada quase que exclusivamente pelas fezes através de rotas não-biliares em uma forma inativa.

Diferentemente de outros antimicrobianos de sua classe, a presença de alimento no estômago não interfere na absorção da doxiciclina.

PRECAUÇÕES

- Obedecer ao modo de uso e dosagens indicadas para o uso do produto.
- Diferentemente das outras tetraciclina, a doxiciclina não é nefrotóxica, podendo ser utilizada em pacientes com problemas renais e idosos.
- Em gatos, pode-se realizar a administração do comprimido juntamente com 5-6 mL de água (via seringa) ou com uma porção de alimento, para evitar possíveis eventos adversos relacionados à administração do produto (desenvolvimento de lesões esofágicas).
- Em cães e gatos com doenças hepáticas severas, a doxiciclina deve ser utilizada com cautela.
- Não é recomendado o uso em animais com menos de 1 ano de idade.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

- Não administrar em animais com histórico de hipersensibilidade à doxiciclina.
- Não administrar em cadelas prenhes ou em fase de lactação.
- Não administrar em animais com menos de 1 ano de idade.

• Não administrar o produto com o prazo de validade vencido.

REAÇÕES ADVERSAS

Os efeitos adversos mais comumente relatados em terapias orais com doxiciclina em cães e gatos são a náusea e o vômito. Para minimizar esses efeitos, pode-se administrar o antimicrobiano junto com alimento sem redução clinicamente significativa na absorção do medicamento. Em gatos a administração via oral pode causar hipertermia, além de úlceras esofágicas e estreitamento esofágico. As tetraciclina quelam o cálcio dos dentes e ossos; incorporam-se nessas estruturas, inibindo a calcificação, podendo causar, por exemplo, a hipoplasia do esmalte dentário, provocando uma coloração amarelada e depois amarronzada. Relatam que com a doxiciclina o efeito quelante é menor, possivelmente devido à sua natureza lipofílica. Apesar de possuir menor efeito quelante sobre o cálcio, o uso da doxiciclina durante a gestação, em animais em fase de crescimento e em processo de dentição não é recomendado. Reações de fotossensibilidade e hipersensibilidade foram descritas. A lesão mais comumente relatada é a dermatite. Tratamentos com tetraciclina, especialmente os de longa duração, podem resultar em supercrescimento de bactérias ou fungos não susceptíveis ao ativo, podendo provocar distúrbios gastrointestinais, após administração por via oral ou parenteral, ou "infecção persistente" quando tetraciclina são aplicadas topicamente. Efeitos hepatotóxicos decorrente de altas doses de tetraciclina são relatados em mulheres grávidas e em outros animais, com alta taxa de mortalidade.

Bula Bioxin 50 mg
BIO020437
Data: 02/05/24
Programa: Corel

Preto
Papel SuperBond 50 g - Azul
261,11mm x 204mm

