

136,00 mm

**APRESENTAÇÕES**

Frascos contendo 20 mL, 50 mL e 100 mL.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000235-6.000017 em 15/07/2003.

**Responsável técnico:**

Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

**Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.**

**Proprietário e Fabricante:****BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.**

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710

14.876-150 - Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113



EMBALAGEM RECICLÁVEL



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 702 3551  
www.biofarm.com.br



PRODUTO BRASILEIRO

**BIOFARM**  
Tecnologia em veterinária

020095.170524-INV2

**TETRAVET****ANTIMICROBIANO DA FAMÍLIA DAS TETRACICLINAS****USO VETERINÁRIO**  
Solução Injetável**FÓRMULA**

Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina (cloridrato)	20,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

**ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:**  
**BOVINOS, OVINOS E SUÍNOS:** ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "30" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.  
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

**INDICAÇÕES**

**TETRAVET** é indicado para o tratamento de processos infecciosos que acometem os bovinos, ovinos e suínos, tais como:

**Bovinos:** Anaplasmose (*Anaplasma marginale*), pneumonia (*Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Mycoplasma* spp., *Bordetella* spp. e *Klebsiella* spp.), leptospirose (*Leptospira* spp.), podridão do casco

(*Fusobacterium* spp. e *Actinomyces pyogenes*), pasteurelose (*Pasteurella* spp.), diarreias (*Escherichia coli* e *Salmonella* spp.), actinobacilose (*Actinobacillus* spp.), ceratocconjuntivite infecciosa (*Moraxella bovis*), carbúnculo sintomático (*Clostridium chauvoei*), mastite, artrite infecciosa e feridas infecciosas (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Pasteurella* spp., *Mycoplasma* spp. e *Bacillus* spp.), dermatofilose (*Dermatophilus* spp.).

**Ovinos:** Pneumonia (*Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp. e *Mycoplasma* spp.), diarreias causadas por *Escherichia coli* e *Salmonella* spp., aborto enzoótico (*Salmonella* spp.), podridão do casco (*Fusobacterium* spp. e *Actinomyces pyogenes*), vibriose ovina causada por *Campylobacter foetus*, mastite, artrite infecciosa e feridas infecciosas (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Pasteurella* spp., *Mycoplasma* spp. e *Bacillus* spp.).

**Suínos:** Pneumonia (*Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Mycoplasma* spp., *Bordetella* spp. e *Klebsiella* spp.), leptospirose (*Leptospira* spp.), erisipela (*Erysipelothrix* spp.), síndrome MMA (*Escherichia coli* e *Klebsiella* spp.), diarreias (*Escherichia coli* e *Salmonella* spp.), rinite atrófica (*Bordetella bronchiseptica*).

**MODO DE USAR E POSOLOGIA**

**TETRAVET** deve ser administrado em dose única, por via intramuscular profunda, na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal (20 mg de oxitetraciclina por kg de peso). Para volumes acima de 10 mL, dividir em 2 pontos de aplicação. A dose e a duração do tratamento poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

**CONTRAINDICAÇÕES**

O produto não é indicado para cães, gatos, equinos e muares. O produto é contraindicado para animais com hipersensibilidade às tetraciclinas ou com problemas hepáticos.

**PRECAUÇÕES**

Lavar as mãos após o uso e evitar contato com os olhos. Depois de aberto o frasco, recomenda-se a utilização do produto dentro de 4 semanas. O escurecimento da solução pode ocorrer, o que não significa perda de eficácia. O produto com prazo de validade vencido nunca deverá ser utilizado pois poderá causar nefrotoxicidade grave. Recomenda-se obedecer aos cuidados de assepsia rotineiros para injeção intramuscular.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

O produto não deve ser associado às penicilinas.

**EFEITOS COLATERAIS**

A oxitetraciclina pode eventualmente provocar reações alérgicas e anafiláticas. Poderá ocorrer também reação leve a moderada, de caráter transitório, no local da infecção. Caso seja observada alguma reação indesejável, recomenda-se consultar o Médico Veterinário.

Bula Tetravet

BIO020095

Data: 17/05/24

Programa: Corel



Papel Off Set 56g - Branco

136mm x 128mm

**Dobras:**